



1880.

Verzeichniß

der

grösstentheils im Freien ausdauernden Stauden-Gewächse

einschliesslich der

Alpen-Pflanzen, Freiland-Farne,
sowie Freiland-Eriken

und einem Anhang über Erdbeerpflanzen,

welche

in den Gräflich Stolberg'schen Gärten

zu **Wernigerode a. H.**

gegen Kasse oder Tausch abgebbar sind.

Gefällige Aufträge wolle man richten an den Hofgärtner G. Eichler.

Wernigerode.

Druck von B. Angerstein.

Zur gefälligen Beachtung!

Die Preise verstehen sich per Kasse netto, in deutscher Reichswährung,
1 Mark = 1 Fr. 25 Cent. = 1 Schilling, Werthpapiere nach Cours.

Den Bestellungen bitte ich den Betrag beizufügen oder Nachnahme zu gestatten. Denjenigen unserer verehrlichen Geschäftsfreunde, für welche wir ein laufendes Konto führen, gewähren wir einen dreimonatlichen Kredit.

Briefe und Gelder werden franko erbeten. Emballage wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr der Besteller, doch wird für eine sorgfältige und sachgemäße Verpackung gesorgt.

Reklamationen können nur dann berücksichtigt werden, wenn dieselben spätestens 24 Stunden nach Empfang gemacht und genügend begründet werden.

Den Staudenfreunden möge zur gefälligen Nachricht dienen, daß fortan die größte Sorgfalt den einst sich eines bedeutenden Rufes erfreuenden Staudenkulturen zugewendet werden soll. Die Sortimente werden durchgängig revidirt, die Nomenclatur soweit thunlichst berichtigt.

Die neueren und besseren, ebenso auch die abhanden gekommenen älteren guten Stauden, sollen nach Kräften durch Tausch oder Kauf wieder beschafft werden, und werde ich für jede mir hierbei zu Theil werdende Unterstützung ganz besonders dankbar sein.

Das Verzeichniß über Stauden und einige andere Sämereien ist in Bearbeitung und wird noch vor dem ersten November erscheinen.

Die Verzeichnisse über Gewächshauspflanzen und Baumschul-Artikel werden später erscheinen.



Erklärung der Zeichen.

Die wenigen mit *T* bezeichneten Arten sind für unsere, sehr oft veränderlichen Winter etwas zärtlich, daher anzurathen, davon immer einige in Töpfen zu halten und möglichst frostfrei zu durchwintern. Mit *z* bezeichnete sind nur zweijährig und sterben in der Regel nach der Blüthe ab, daher dieselben jährlich aus Samen nachgezogen werden müssen. Die mit Δ versehenen sind entweder wirkliche Alpenpflanzen, oder solche, die sich zur Bepflanzung künstlicher Alpen- oder Steinpartien eignen.

Die zu Einfassungen von Blumenbeeten u. geeigneten Pflanzen sind mit Schockpreisen versehen. Die Schock- und Duzendpreise gelten jedoch nur bei Abnahme von wenigstens $\frac{1}{2}$ Schock resp. $\frac{1}{2}$ Duzend, werden weniger verlangt, so treten die Stückpreise ein.

Um den Blumenfreunden die Auswahl einigermaßen zu erleichtern, sind die schönsten und vorzüglichsten Arten und Varietäten mit einem * versehen.

Diejenigen bei denen kein Preis bemerkt ist, können wegen mangelnder Vermehrung noch nicht abgegeben werden, der größte Theil derselben aber gewiß zum nächsten Herbst; die andern Stauden sind meist abgebbar, soweit Vermehrung vorhanden, oder in der kurzen Zeit meines Hierseins sich beschaffen ließ.

Von fast allen Samen tragenden Pflanzen wird auch in jedem Frühjahr Samen abgegeben, und die Portien mit 10 Pfg. berechnet.

Bei größerem Bedarf für Wiederverkäufer stehen jedem Herbst Verzeichnisse mit 20-Grampreisen zu Diensten, die Anfang Oktober abgefordert werden können.

		à St. à Dtz.				à St. à Dtz.	
		Pf.	Pf.			Pf.	Pf.
Acanthus , Acanthaceae				Acouitum , ochroleucum			
Bärenflau				Hort. f. Lycoctonum.			
T	longifolius Poir.	50	—	orientale Mill.		20	—
	lustanicus	—	—	pyramidale, = Napellus.			
T	mollis L.	40	—	rubrum		30	—
	niger Mill.	40	—	rhynchanthum Rchb., f.			
	spinosissimus Desf.	40	—	variegatum.			
	spinosus L.	30	—	Störkianum Rchb.		30	—
Aceranthus , Berberideae				tauricum Wulf., = Na-			
diphyllus Morr. Decais. 40 250				pellus.			
(Epimedium diphyll.)				unicinatum L.		20	100
Achillea , Compositae-				variegatum L.		20	100
Achilleae Garbe.				Vulparia Rchb., =			
Δ	alpina L., siehe Ptarmica			Lycoctonum.			
	alpina.			Willdenowii Rchb. =			
	filipendulina Lam.	20	120	Napellus.			
*	(Eupatorium Bbrst.)			Acorus , Aroideae, Rasmus			
	lanata Lam. f. Ptarmica			Δ gramineus Ait. foliis			
	nana.			variegatis		20	—
	macrophylla L. f. Ptarmica			Actaea , Ranunculaceae,			
	macrophylla.			Christopfskraut.			
*	Millefolium L. flore rubro	20	100	Cimicifuga L.		30	—
	myriophylla Willd.	20	—	pterosperma Turtsh.		40	—
*	Ptarmica L. flore pl.	20	100	* racemosa L.		40	—
§	Für Bouquetbinderei sehr werthvoll			* spicata L.		40	—
	Ptarmica grandiflora	20	—	Actinospora , dahurica			
	sambucifolia Desf. siehe			Turtsh., = Actaea			
	Pyrethr. macrophyllum.			pterosperma.			
Aconitum , Ranunculaceae,				Actinomeris , Compositae-			
Eisenhut.				Bidentes.			
	Anthora L.	20	—	helianthoides Nutt.		40	—
	dissectum Don.	20	—	Adenophora , Campanu-			
	excellentissimum	20	—	laceae, Drüsenträger.			
	Halleri Rchb. f. Napellus.			coronata Desf. fil.		30	—
	illinitum Rchb. = va-			(campanula c Kerr. Dr.)			
	riegatum.			denticulata Ledeb. =			
	Lycoctonum L.	30	120	tricuspidata.			
	Mielichhoferi Rchb., =			* elegans		40	—
	Napellus.			Lamarikii Fish.		40	—
	moldavicum Hacq., =			* liliifolia Ledeb.		40	—
	Lycoctonum.			* stylosa Fisch.		40	—
	Napellus L.	20	—	suaveolens Rchbch. =			
	„ pyramidale Mill.	20	—	liliifolia		40	—
	nemorosum Bbrst., =			tricuspidata Dec. fil.		40	—
	Anthora.						

	à St.	à Dtz.	
	Pf.	Pf.	
Adenostyles , Comp.-Eupatoriaceæ, Drüsengriffel.			
albifrons Rchbch = Petasites.			
— alpina Blff. et Fngsch.	50	—	
— Petasites Bluffet Fngsch.	—	—	
Adlumia , Fumariaceae.			
— cirrhosa Rafin ♂	30	—	
(Corydalis fungosa Vent.)			
Adonis , Ranunculaceae, Adonisröschen			
* vernalis L.	30	150	
Agrimonia , Rosaceæ, Odermennig.			
— caffra	30	—	
— repens L.	30	—	
Agrostemma , Caryophylleae, Rabe.			
— coronaria L. ♂	20	60	
— „ flore albo ♂	20	60	
— „ bicolor ♂	20	60	
Weiß mit rothem Auge, schön.			
— flos Jovis L.	30	—	
Ajuga , Labiatae, Gänsef.			
— reptans L. fol. purpureis	10	60	
Sehr hübsch, zu Winter-Toppf- beeten verwendbar.			
Alechemilla , Rosaceae, Frauenmantel.			
Δ alpina L.	30	—	
Δ pubescens Bbrst.	30	—	
Allium , Alliæ, Lauch.			
— carinatum L.	20	—	
* coerulescens Don.	40	—	
(azureum Ledeb.)			
* Moly L.	20	50	
Althaea , Malvaceae, Eibisch, Malve.			
— narbonnensis Pourr. Cav.	20	—	
— rosea Cav. ♂ flore pleno	—	—	
— Charteri, Chartersche Preis- malven in folgenden Sorten:			
— alba grandiflora			
— argentea			

	à St.	à Dtz.	
	Pf.	Pf.	
Countess of Russel			
Cramy white			
Emmeline			
James Allaun			
Imperator			
Isabellina			
Lady Clark			
Miss Lizzie King			
Mr. Charter			
Minerva			
Non plus ultra			
Othello			
Rosea pallida			
Safrano			
Standard rival			
Syrian Prince.			
Jede d. vorstehenden Sorten à 20	200		
Die Charterschen Preismalven sind anerkannt das vollkommenste unter den gefüllten Malven.			
Alyssum , Cruciferae.			
* Wierzbickii Heufel	30	—	
— saxatile L. compactum	20	—	
Amsonia , Apocynae.			
— angustifolia Michx.	30	—	
— latifolia Michx.	40	—	
— salicifolia Pursh.	30	—	
Anchusa , Boraginæ, Dänsenzunge.			
— azurea Mill. = paniculata.			
— officinalis L.	—	—	
— „ incarnata	20	120	
T paniculata Ait. ♂	30	—	
— sempervirens L.	—	—	
(Omphalodes semperv. Don.)			
Androsaemon , Hypericinea.			
— officinale All.	30	—	
(Hypericum Androsæm)			
Anemone , Ranunculaceae, Windröschen.			
— aconitifolia Michx., siehe			
— pensylvanica.			
— alba Juss.	30	—	

	à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.
Δ <i>Anemone</i> , alpina L. siehe Pulsatilla alpina.		
<i>T*</i> coronaria L.	5	50
flore pleno	10	100
Garten-Anemone in Pracht-Varietäten.		
japonica Zucc.	30	250
„ flore albo	40	—
(Honorine Jobert).		
„ elegans	—	—
hortensis = stellata.		
hybrida	30	250
montana Hoppe siehe Pulsatilla mont.		
multifida Poir.	30	—
Δ narcissiflora L.	50	—
Sehr distinkte alpine Species.		
* nemorosa L. fl. albo pl.	20	80
ochotensis Fisch = alba	—	—
pennsylvanica L.	30	—
Pulsatilla L. f. Pulsatilla vulgaris.		
stellata Lam.	10	100
* sylvestris L.	20	80
<i>Antennaria</i> , Compositae- Gnaphalieae.		
dioica Gært.	5	50
Beliebte Teppichpflanze zuzier- lichen Zinten, auch für Winter- teppichbeete sehr zu empfehlen.		
<i>Anthemis</i> , Compositae, Ramille.		
rigescens Willd.	20	—
„ flore albo	—	—
<i>Anthericum</i> , Asphodeleae, Zaunfille.		
* graminifolium Willd.	20	—
* Liliago L.	20	120
* „ varietas Benaryi	30	—
* Liliastrum L. f. Czackia.		
* ramosum L.	20	120
<i>Antirrhinum</i> , Scrophula- riaceae, Löwenmaul.		
Δ Cymbalaria L., siehe Linaria Cymb.		
majus in Prachtvarietäten	10	100
m. Tom Thumb. do.	10	100

	à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.
<i>Antirrhinum</i> , pilosum L. siehe Linaria pilosa.		
<i>Apocynum</i> , Aporcyneae, Hundswölle.		
* androsämisfolium L.	40	—
Bekannt als Fliegenfänger, ge- hört zu den feinsten und lange blühenden Stauden.		
venetum L.	40	—
salicifolium R. Willd.	40	—
<i>Aquilegia</i> , Ranunculaceae, Aselei.		
arctica Hort. Loud.	40	—
* canadensis L.	20	—
„ elatior	20	180
* Durandi fl. pl. gestreift	30	—
* jucunda Fisch et Lallern.	50	—
nivea Baumg.	30	—
<i>T*</i> Skinneri Hock	30	—
* sibirica Lam.	20	100
„ flore carneo pleno	80	—
„ „ rubro pleno	60	—
<i>Arabis</i> , Cruciferae, Gäuse- fraut.		
alpina L. foliis variegatis	30	—
Δ bellidifolia L.	20	—
<i>Aralia</i> , Araliaceae, Berg- angelika.		
cashemirica Royle	100	—
macrophylla Lindl.	100	—
racemosa L.	100	—
Die Aralieen sind dekorative Blatt- pflanzen und einzeln auf Rasen sehr verwendbar.		
<i>Arenaria</i> , Caryophylleae, Sandfraut.		
Δ balearica L.	20	—
Neuester zierlich.		
<i>Armeria</i> , Plumbagineae, Grasnelke.		
alpina Willd.	20	—
angustifolia	20	—
dianthoides Hornem.	20	—
Halleri Wallr.	30	—
maritima Willd.	10	30

	à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.
<i>Armeria</i> , <i>maritima</i> flore		
<i>purpureo</i> . . .	20	80
<i>maritima</i> <i>Lauchiana</i>	20	—
<i>plantaginea</i> <i>Willd.</i>	30	—

<i>Arundinaria</i> , <i>Bambusea</i> .		
<i>japonica</i> <i>Sieb.</i> . . .	50	—
(<i>Bambusa</i> <i>Metake</i> <i>Vilm.</i>)		

Hält in Norddeutschland unter Decke gut aus und bildet breite ornamentale Büsche; auch als Kalt- hauspflanze sehr dekorativ.

<i>Artemisia</i> , <i>Compos.</i> - <i>Anthemideae</i> , <i>Beifuß</i> .		
<i>Abrotanum</i> <i>L.</i> <i>Eberwurz</i> ;	20	—
<i>Absinthium</i> <i>L.</i> <i>Bermuth</i>	20	50
<i>Dracunculus</i> <i>L.</i> <i>Esdragon</i>	20	50
<i>Ludoviciana</i> <i>Mitt.</i> . . .	20	—
<i>Stelleriana</i>	10	100

Als Teppichpflanze durch den niedrigen Wuchs und die silbergraue Belaubung sehr geschätzt, auch in den Rand niedriger Bosquets gepflanzt, effektiv, winterhart.

<i>repens</i> <i>Pall.</i>	20	—
------------------------------------	----	---

<i>Arum</i> , <i>Aroideae</i> , <i>Aronswurz</i> .		
<i>Arisarum</i> <i>L.</i>	30	—
<i>italicum</i> <i>Mitt.</i> <i>Lam.</i>	30	—
<i>maculatum</i> <i>L.</i> . . .	20	80

<i>Asarum</i> , <i>Aristolochiaeae</i> , <i>Haselwurz</i> .		
<i>canadense</i> <i>L.</i> . . .	40	—
<i>europaeum</i> <i>L.</i> . . .	20	—

<i>Asclepias</i> , <i>Asclepiadeae</i> , <i>Schwalbentwurz</i> .		
<i>consanguinea</i> <i>Knze.</i>	50	—
<i>Douglasii</i> <i>Hook.</i> . .	50	—
<i>princeps</i> <i>Barth</i> . . .	40	—
* <i>tuberosa</i> <i>L.</i>	50	—

Mit prachtvollen leuchtend orangefarbenen Blüthendolden, eine der effektivsten Staude überhaupt, verlangt sandigen Boden.

<i>Asperula</i> , <i>Rubiaceae</i> , <i>Waldmeister</i> .		
Δ <i>laevigata</i> <i>L.</i>	20	—

	à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.

Δ <i>Asperula</i> , <i>odorata</i> <i>L.</i>	20	—
Echter Waldmeister, zum Mat- trank sehr gesucht.		

<i>Asphodelus</i> , <i>Asphodeleae</i> , <i>Affodill</i> .		
<i>albus</i> <i>Willd.</i>	50	—
<i>luteus</i> <i>L.</i>	30	150
<i>flore pleno</i> . . .	30	200
<i>ramosus</i> <i>L.</i>	50	—
<i>tauricus</i> <i>Pall.</i> . . .	40	—

<i>Aster</i> , <i>Compositae</i> - <i>Astereae</i> , <i>Sternblume</i> .		
--	--	--

Δ* <i>alpinus</i>	10	50
* <i>Amellus</i> <i>L.</i>	20	100
* <i>amelloides</i> <i>Bess.</i> . .	20	100
<i>bicolor</i>	20	—
<i>concolor</i> <i>L.</i>	20	—
<i>cyaneus</i> <i>Hoffm.</i> . . .	20	—
<i>diffusus</i> <i>Ait.</i>	20	—
<i>ericoides</i> <i>L.</i>	20	—
<i>foliosus</i> <i>Ait.</i>	20	—
<i>fragilis</i> , <i>Willd.</i> . . .	20	—
<i>mollis</i>	20	—
* <i>Novae Angliae</i> <i>L.</i> . .	20	—
* " " <i>fl. roseo</i>	20	—
* " " <i>fl. rubro</i>	20	—
* <i>Novi Belgii</i> <i>L.</i> . . .	30	—
* <i>pendulus</i> <i>Ait.</i> (<i>horizon-</i> <i>talis</i> <i>Desf.</i>)	30	—
<i>recurvatus</i>	20	—
<i>serotinus</i> <i>Willd.</i> . . .	20	—
<i>spurius</i> <i>Willd.</i> =		
<i>Novae Angliae.</i>		

<i>Astragalus</i> , <i>Papilionaceae</i> , <i>Tragant</i> .		
<i>falcatus</i> <i>Lam.</i> . . .	20	—
<i>galegiformis</i> <i>L.</i> . . .	20	—
<i>glyciphylloides</i> <i>Dec.</i>	20	—
<i>leucophaeus</i> <i>Sm.</i> . .	30	—

<i>Astrantia</i> , <i>Umbelliferae</i> , <i>Sternbolbe</i> .		
<i>alpina</i>	—	—
<i>Biebersteinii</i> <i>Fisch. Mey.</i>	40	—
Δ <i>carniolica</i> <i>Jacq.</i> . .	40	—
<i>caucasica</i> <i>Willd. Spr.</i>	—	—

	à St. à Dtz.			à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.		Pf.	Pf.
Astrantia , Epipactis L., siehe Haquetia Ep.			Anna, Adelaide, Adele, Ade- laide Stoperford, Antoinette, Francisca, Highländer, La- tona, Orestes, Prince of Wales, Purple, Malvina, Susanna	10	100
* helleborifolia Salisb.	20	—	Betonica , Labiatae, sehr frucht.		
intermedia Bbrst. siehe caucasica.			* grandiflora Stev., siehe Stachys grandiflora.		
Blüthen von allen species originell.			orientalis L., f. Stachys longifolia.		
Aubrietia , Cruciferae.			serotina Host., siehe Stachys Betonica.		
Campbelli.			stricta Ait., siehe Stachys Betonica.		
Δ Columnae Guss.	30	—	Bidens , Compositae.		
Δ deltoidea Dec.	20	150	atrosanguinea	30	100
„ purpurea	—	—	Biebersteinia , Zygophylleae,		
Δ erubescens Grieseb.	30	—	Orphanidesi	—	—
Δ Graeca fol. var.	—	—	Biotia , Compositae-Astereae.		
Δ purpurea siehe deltoidea	—	—	corymbosa Dec.	20	—
Δ spathulata	—	—	(Aster corymbosus Ait.)		
Reizende Einfassungspflanzen.			Bocconia siehe Macleya.		
Balsamita , vulgaris Willd., — f. Pyrethrum Tanacetum.			Buphthalmum , Compo- sitae, Döschenzunge.		
Bambusa , Bambusaceae, Bambus.			cordifolium Waldst. Kit. f. Telekia cordifolia.		
T* Fortunei v. Houtte	50	—	grandiflorum L.	20	150
Metake f. Arundinaria.			var. salicifolium L.	30	—
Baptisia , Papilionaceae.			Bupleurum , Umbelliferae		
* australis R. Br.	30	—	Nasenohr.		
* exaltata Sweet	40	—	longifolium L.	20	—
* leucantha	50	—	Cacalia , Compositae-Ja- cobeae.		
* perfoliata R. Br.	50	—	suaveolens L.	30	—
Die Baptisien müssen mehrere Jahre an einer Stelle verbleiben ehe sie ihre große Schönheit ent- falten.			Calliopsis , Comp Amphi- ceniantae, Schöngesicht.		
Barnardia , Asphodeleae.			Atkinsoniana Hook.	20	—
scilloides Lindl.	50	—	Caltha , Ranunculeae, Dotterblume.		
(Ornithogalum chinense Lour.)			* palustris L. flore pleno	20	130
Bellis , Compositae-Aste- reae, Tausendschön.			* „ grandiflora fl. pl.	30	240
perennis L., weiß, roth, dunkelroth, zweifarbig, weiß in Lila übergehend	—	50	Calluna , f. Freiland-Gräfen.		
perennis var. aucubae folia flore pleno	—	100			
perennis var. minor. weiß in Lila übergehend, rosa fistulirt, dunkelrosa	—	50			

	à St.	à Dtz.	
	Pf.	Pf.	
Calystegia , Convolvulaceae, Bärwinde.			
dahurica Fisch f. Convolvulus davuricus Lindl.			
pubescens Lindl. fl. pl.	20	150	
Prächtige gefüllte Winde			
Doria incarnata . . .	30	200	
(Convolvulus Doria incarnata, Catalog. Booth.	30	—	
Campanula , Campanulaceae, Glockenblume.			
* carpatia L. fil. . .	20	150	
* „ flore albo . . .	30	240	
Beide ausgezeichnet zu Einfassungen.			
eximea δ . . .	20	—	
* gummifera Willd. = sarmatica.			
lactiflora Bbrst. . .	30	—	
* lamifolia Bbrst. . .	40	—	
* latifolia L. . . .	30	180	
„ eriocarpa . . .	30	180	
* „ flore albo . . .	30	180	
Δ lilifolia Lam., f. Adenophora Lamarkii.			
* macrantha Fisch = latifolia.			
* Medium L. calycanthema	30	—	
* „ flore albo . . .	30	—	
* nobilis Lindl. . .	30	180	
* pulla L.	20	50	
* pusilla Hænke . . .	20	—	
„ flore albo . . .	20	8)	
„ pallida . . .	30	—	
* pyramidalis L. . .	30	—	
„ flore albo . . .	50	—	
rotundifolia L. soldanelliflora plena . . .	—	—	
* sarmatica Ker. . .	30	—	
Trachelium L. . . .	20	100	
„ flore pleno	30	180	
Carex , Cyperaceae, Segge.			
australis foliis variegatis	20	—	
Catananche , Compos.-Cychoreae, Rastelblume.			
coerulea L. . . .	20	120	

	à St.	à Dtz.	
	Pf.	Pf.	
Catananche , coerulea flore albo (bicolor)	20	120	
Centaurea , Comps.-Caryophylleae, Stoenblume.			
calocephala Willd. . .	30	—	
(atropurpurea W. K.)			
dealbata Willd. . .	30	—	
flava	—	—	
glastifolia L. . . .	30	—	
montana L. . . .	20	80	
„ flore albo . . .	20	100	
nigrescens Willd. . .	20	100	
sibirica L.	20	—	
Centranthus , Valerianae.			
* ruber Dec.	20	100	
(Valeriana rubra L.)			
* ruber flore albo . . .	20	100	
* „ flore coccineo . . .	20	120	
Cephalaria , Scabiosae.			
alpina R. S.	30	—	
(Scabiosa alpina L.)	—	—	
centauroides R. S. . .	30	—	
(Scab. centaur. Lam. Dr.)			
Cerastium , Caryophylleae, Hornfraut.			
Biebersteinii Dec. . .	15	—	
Δ grandiflorum W. K. .	30	—	
repens L.	20	—	
Δ tomentosum Dec. . .	15	120	
Chelone , Scrophularineae, Schildblume.			
* barbata Cav.	30	—	
* obliqua L.	30	180	
Chrysanthemum .			
indicum L., in nächsten henden vorzügl. Sorten.			
Soeur Melanie, reinweiß.			
Mad. de Soulage, feurig groß.			
Plantagenes, feurig amarant.			
La Nympe, rosa.			
Louis Barthere, dunkelpurpur.			
Proserpine, niedrig, brillant gelb.			

	àSt. àDtz.	
	Pf. Pf.	
Chrysocoma.		
* Linosyris L., siehe Linosyris vulgaris.		
Cimicifuga.		
foetida L., siehe Actaea Cimicifuga.		
Cineraria.		
macrophylla, (argentea) f. Ligularia macrophylla.		
Clematis, Ranunculaceae, Waldrebe.		
augustifolia Jacq.	20 100	
campaniflora Brot.	30 —	
corymbosa Poir = erecta		
crispa L.	30 —	
cylindrica Sims.	30 —	
erecta All.	20 100	
Gebleriana Bongd.	40 —	
glauca Willd.	40 —	
* Hendersonii Hort.	40 —	
„ variegata	40 —	
hybrida	30 —	
„ hispanica	30 —	
integrifolia L.	— —	
lasiantha Fisch. = angustifolia.		
lathyrifolia Bess.	30 —	
orientalis L.	50 —	
ochroleuca Ait.	50 —	
Pallasii Gmel. = angustifolia.		
pavrisiflora Dec.	30 —	
(revoluta Hor. Par.)		
Schillingi	40 —	
songarica Siev. = glauca		
stricta Wender	40 —	
„ thyrsoiflora	40 —	
tubulosa Turcz.	50 —	
Vitalba L.	20 100	
* Viticella L.	30 —	
„ flore rubro	30 —	
* Viorna L.	40 —	
verticillaris Dec.	30 —	
Codonopsis, Campanulaceae.		
* lurida	30 300	

	àSt. àDtz.	
	Pf. Bf.	
Colchicum, Colchiceae, Herbstzeitlose.		
autumnale L.	20 80	
„ flore albo	20 —	
* „ flore pleno	50 —	
* byzantinum Gawl.	40 —	
patens Schz. = autumnale.		
* variegatum L.	40 —	
Sehr schön schachbrettartig gezeichnet.		
Commelina, Commelineae.		
coelestis Willd.	20 60	
„ flore albo	20 —	
„ foliis variegatis	20 —	
Convallaria, Smilaceae, Maiblume.		
* bracteata Thomas.	30 200	
gigantea	— —	
latifolia Jacq.	40 —	
majalis L.	10 50	
„ marginata	20 100	
„ flore pleno	20 100	
„ flore roseo	20 100	
„ foliis striato variegatis	20 100	
* multiflora L.	20 150	
„ flore roseo	20 —	
Polygonatum L.	20 —	
* „ flore pleno	20 180	
stellata L. f. Smilacina stellata.		
verticillata L.	30 —	
Convolvulus, Convolvulaceae, Winde.		
davuricus Sims.	20 80	
* Doria incarnata, Cat. Booth., f. Calystegia.		
T* mauritanicus	40 —	
Eine prächtige Ampelpflanze die frostfrei überwintert werden muß.		
Coreopsis, Comp. Amphicniantae, Wanzenblume.		
* auriculata L.	40 —	
Atkinsoniana Dougl., f. Calliopsis Atkinsoniana,		

	à St.	à Dtz.		à St.	à Dtz.
	Pf.	Pf.		Pf.	Pf.
Coreopsis , lanceolata L.	30	—	Δ* Cyclamen , repandum Sibth.		
philadelphica . . .	30	—	= (C. ficifolium Hort.)		
Coriaria , Coriariaeae.			Vorstehende Alpenveilchen halten		
T myrtifolia L. . . .	40	—	unsern Winter unter einer Moos-		
Corydalis , Fumariaceae,			decke im Freien aus und sind sehr		
Hohlwurz.			empfehlenswerth Die Kultur hat		
bulbosa Pers. . . .	10	50	keine Schwierigkeiten wenn man		
" flore albo . . .	10	50	ihnen einen schattigen Stand und		
* capnoides Pers. . . .	30	—	Halde- oder halberrothete Laub-		
Cucullaria Pers., siehe			erde oder eine Mischung beider		
Dicentra C.			gibt, doch gedeihen sie auch im		
fungosa Vent. siehe Ad-			Lehmboden Die Knolle dieser Ver-		
lumia cirrhosa.			ten werden 2 Zoll tief gelegt.		
* lutea Dec. = capnoides.			C. repandum und C. cum blü-		
* nobilis Pers. . . .	40	360	hen im März, latifolium, hederæ-		
* spectabilis Pers., siehe			folium und europaeum blühen im		
Dicentra sp.			Spätherbst.		
Cousinia , Comp. Cynareae.			Cynanchium , Asclepia-		
Hystrix Meyer . . .	30	—	deae, Hundswürger.		
(Carthamnus pterocau-			fuscum Link . . .	30	—
lon Meyer).			nigrum Pers. . . .	30	—
Crambe , Cruciferae.			Vincetoxicum Pers. . .	20	100
cordifolia Steven. . .	30	—	Cypripedium , Orchideae,		
Crocus , Croci.			Frauenschuß.		
iridiflorus Heuff. . .	20	—	Calceolus L. . . .	40	—
sativus L. . . .	20	—	spectabile Sw. . . .	—	—
vernus Smith . . .	—	30	Czaackia , Asphodeleae.		
Crucianella , Rubiaceae,			Liliastrum Andr. . .	30	180
Kreuzblatt.			Prächtige große weiße Blume.		
* stylosa Trin. . . .	30	180	Datisca , Daphniphyta.		
* purpurea	30	—	cannabina L. . . .	—	—
Reizend zu Einfassungen.			(Cannabis laevis Spr.)		
Cyclamen , Primulaceae,			Delphinium , Ranuncula-		
Alpenveilchen.			ceae, Rittersporn.		
Δ* Coum Mill. . . .	—	—	* bicolor Nutt. . . .	30	—
Δ* europaeum L. . . .	40	—	* formosum Hort. . . .	20	—
Δ* hederæfolium Ait. . .	—	—	* magnificum	50	—
(C. neapolitanum Tenor.)			* nudicaule	40	—
Δ* latifolium Smith. =			Prächtig, mit scharlachrothen Blüten.		
(C. hederæfolium Sibth.)			Dentaria , Cruciferae,		
			Zahnwurz.		
			Δ digitata Lam. . . .	40	—
			Δ polyphylla Waldst. K.	50	—

	à St.	à Dtz.		à St.	à Dtz.
	Pf.	Pf.		Pf.	Pf.
Desmodium, Papilionaceae, Fesselhülse.			Dictamnus, albus fl. rubro	40	—
canadense	—	—	angustifolius Sweet	40	—
Dilleni	—	—	caucasicus	50	—
penduliflorum	50	—	davuricus	50	—
Ist im Spätherbst mit reihen Schmetterlingsblumen überdeckt.			Fraxinella Pers. = alba.		
Dianthus, Caryophylleae, Nelke.			Digitalis, Scrophularineae, Fingerhut.		
* barbatus L.	—	—	* Buxbaumii	30	—
* „ flore pleno	20	50	* ferruginea L.	30	—
* Caryophyllus L. fl. pl. beste Landnelken in Rommel	20	150	* gigantea	30	—
caryoph. semperflorens flore pleno			lutea L.	20	—
Remontirende Topfnelken.			maculata Iveryana	20	—
Grenadier	—	—	purpurea L.	20	—
Souvenir de Malmaison	—	—	„ flore alb	20	—
Sämlinge, Rommel	10	100	Digraphis, Gramina, Mi- ligras.		
* chinensis L. flore pleno	10	50	arundinacea (L.) Trin. foliis variegatis	10	100
deltoides L.	20	100	(Phalaris arund.)		
giganteus d'Urville	20	100	Dioscorea, Dioscoreae, Yamswurzel.		
* hybridus Anna Boleyn	30	240	Batata D. C.	60	—
* „ Gabriele fl. pl.	30	—	villosa L.	60	—
plumarius L. flore pleno	—	—	Die Dioscoreen sind schnell wachsende Schlingpflanzen welche sehr zu empfehlen.		
„ scotticus fl. pl.	—	—	Diplostegium, Comp. Astereae, Doppel Franz.		
Schottische Federnelken.			umbellatum Dec.	20	100
Agamemnon.			Dodecatheon, Primulaceae, Götterblume.		
Charles X.			Δ* Meadia L.	50	—
Grand duc.			Δ* „ flore albo	50	—
König von Sachsen.			Δ* integrifolia	60	—
Königin der Schotten.			Δ* mancastriense	60	—
Mrs. Maclean.			Dracocephalum, Labiatae, Drachentopf.		
Mr. Hoyle.			* Ruyschiana L.	30	—
Von diesen Pflanzsorten erlasse das Stück mit 20 Pfg., 1 Duzend mit 1,5 Mark.			* virgineanum L. f. Phytostegia virg.		
Dicentra, Fumariaceae.			Dryas, Rosaceae, Waldgöttinfräulein.		
Cucullaria L (Corydalis C.)	30	—	T Drummondii Richards	80	—
spectabilis Dec. (Corydalis spect.)	40	—	octopetala L.	—	—
spectabilis flore albo	40	—			
Dictamnus, Rutaceae, Diptam.					
albus L.	40	—			

	à St	à Dtz.
	Pf.	Pf.
Echinopus , Comp. Echino- podeae, Ringeldistel.		
bannaticus Rochel . . .	30	—
* cornigerus Dec. . . .	30	—
* horridus Desf. . . .	40	
* niveus Wall. . . .	30	—
* Ritro L. . . .	30	—
ruthenicus	30	—
sphaerocephalus L. . .	20	—

Elymus , Gramina, Strand- gerste.		
arenarius L. . . .	20	50
(Hordeum arenarium Aschs).		

Zum Befestigen von Flußsand
vorzüglich geeignet, aber auch we-
gen der silbergrauen Belaubung
effektvoll auf Rasen.

Epilobium , Onagraceae, Weidenröschen.		
* angustifolium L. . .	20	100
„ flore albo	20	100
Dodonaei Vill. . . .	30	—
(angustissimum Ait.)		

Epimedium , Berberideae, Sockelblume.		
* alpinum L. . . .	20	150
Gelb mit braunem Saume.		
* diphyllum Lodd., siehe Aceranthus diphyllus.		
* erectum	40	250
* macranthum Lindl .	40	250
Weiß groß lumig		
* Muschianum Morr. et Dec.	40	250
* pinnatum Fisch. . .	50	300
Gelb, großlumig, sehr früh		
* violaceum Morr. et Dec.	50	300.
Rosa, sehr groß und früh.		

Eranthis , Ranunculaceae, Frühlingsblume.		
hyemalis Salisb.		
(Helleborus h.) . . .	30	200

Erica, f. Freiland-Eriken.

	à St	à Dtz.
	Pf.	Pf.
Erigeron , Comp.-Aster- vidae.		
speciosum Dec. . . .	20	120
(Stenactis speciosa Lindl.)		

Erinus , Scophularineae, Leberbalsam.		
Δ* alpinus L. . . .	30	—

Eriogonum , Polygonaceae.		
flavum Mitt. . . .	30	—
(sericeum Pursh.)		

Erodium , Geraniaceae, Reiher Schnabel.		
T malacoides Willd. .	30	—

Eryngium , Umbelliferae, Mannstreu.		
alpinum L. . . .	50	—
„ paleaceum (fl. p!)	80	—
campestre L. . . .	30	—

Erythronium , Coronariae, Liliaceae.		
Δ* dens canis L. . .	20	150
Δ* „ „ flore albo	30	—

Eupatorium , Comp. Eu- patoria, Baldost.		
altissimum L. . . .	30	—
* aromaticum L. . .	30	180
corsicum	30	—
syriacum Jacq. . . .	30	—
variifolium Bart. . .	40	—

Euphorbia , Euphorbiaceae, Wolfsmilch.		
Lathyris L. . . .	—	—
palustris L. . . .	30	—

Euryangium , Umbelliferae Sumbul, Moschuswurzel	—	—
Berühmtes Mittel gegen die Cholera, weshalb sie in die Phar- macopaea Großbritanniens aufge- nommen ist.		

Ferraria , Irideae, Pfaueniris.		
Tigridia Curt. . . .	20	200
Bekannte Fruchtblume; die Dauer der großen Blüten ist zwar nur ein- tägig, sie werden aber durch täg- lichen Nachwuchs ersetzt.		

	à St. à Dtz.			à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.		Pf.	Pf.
Festuca, Gramina, Schwiegel.			Gaillardia, Comp.-Heli- antheae.		
glauca Lam. Schrader	10	100	aristata Pursh. . . .	20	100
heterophylla Haenk.	20	100	* bicolor	20	100
F. glauca ist für Teppichbeete ausgezeichnet.			lanceolata Michx. .	20	100
			Richardsoni Penni. .	20	120
Ficaria, Ranunculaceae, Scharbockkraut.			Galanthus, Coronariae, Schneeglöckchen.		
ranunculoides Mönch			Imperati	—	—
flore pleno	50	—	Δ nivalis L. 100 St 1,50 M	—	50
(Ranunculus Ficaria L.)			Δ " flore pleno . .	20	100
Fragaria, Rosaceae, Erd- beere.			Δ plicatus Bbrst. . .	40	—
indica Andr.	10	100	Galatella, Com. Astereae.		
Gefällige Ampelpflanzen von feststehender Schönheit, auch zur Be- kleidung von Felspartien ausge- zeichnet.			cana Nees.	20	—
			(Aster canus W. K.)		
Fritillaria, Coronariae, Becherblume.			hyssopifolia Nees. .	20	100
* imperialis L. Kaiserkrone	20	100	(Aster hyssopifolium L.)		
* " fl. luteo	20	100	linifolia Nees. . . .	30	—
* " foliis argent. variegatis	50	—	(Aster linifolia L.)		
Meleagris L.	10	100	multiradiata	20	100
In diversen Varietäten			punctata Dec.	20	100
Fumaria, siehe Corydalis und Dicentra.			(A. punctatus W. K.)		
Funkia, Hemerocallideae.			rigida Cassin. . . .	40	—
* cucullata Hort. . . .	—	—	virgata	30	—
* " fol. alb. marginatis	30	—	Galega, Papilionaceae, Gaiskraute.		
* grandiflora Sieb et Zucc.	50	—	officinalis L.	20	80
* lanceifolia Sprgl. . .	30	—	flore albo	20	100
* marginata Hook. . . .	30	—	biloba Sweet	20	100
* japonica foliis luteo- viride marginatis.	30	—	orientalis Lam. . . .	20	100
* ovata Sprgl.	30	250	Galium, Rubiaceae, Seb- kraut.		
(Hemerocallis coerulea Gawl.)			Δ purpureum L. . . .	30	—
* subcordata Sprgl. .	40	360	Gardoquia, Labiatae.		
(Hemerocallis alba Andr.)			elliptica R. P. . . .	30	—
* undulata foliis elegans- variegatis O. et D.	30	300	(Stachys speciosa Hook).		
			Genista, Papilionaceae, Ginster.		
			sagittalis L.	50	—
			Gentiana, Gentianeae, Enzian.		
			Δ* acaulis L.	10	50
			blühbare Büsche . .	30	300
			Δ asclepiadea L. . . .	—	—

		à St. à Dtz.				à St. à Dtz.	
		Pf.	Pf.			Pf.	Pf.
Gentiana,				Gratiola, Scrophulariaceae,			
Δ asclep. flore albo .	60	—		Gnadenfraut.			
Δ lutea L.	—	—		Δ officinalis L. . . .	30	—	
Geranium, Geraniaceae,				Gypsophila, Caryophyl-			
Storchschnabel.				leae, Gypsfrant.			
aconitifolium Herit .	40	—		* paniculata L. . . .	30	—	
Endressi Gay . . .	40	—		Hablitzia, Chenopodiaceae.			
ibericum Cav . . .	50	—		tannoide; Marsh Bbrst.	60	—	
macrorrhizum L. . .	40	—		Schlingpflanze.			
prostratum Cav. siehe				Haquetia.			
sanguineum.				Epipactis	30	240	
pratense L.	30	—		(Astrantia Epip)			
reflexum L.	30	—		Helianthemum, Cistinae,			
sanguineum L. . . .	30	—		Sonnenröschen.			
(prostratum Cav.)				alpestre Dtn. siehe Ro-			
sang. lancastrienae With.	30	—		dax Steud.			
striatum L.	30	—		lavendulaefolium Pers.	—	—	
phaeum L.	39	—		pilosum Pers.	50	—	
Geum, Rosaceae, Nesselwurz.				roseum Moll. fol. var.	50	—	
* atosanguineum . . .	30	—		rhodanthum Dun. . .	50	—	
* chiloense Balb. . . .	30	150		serpyllifolium Moll.	50	—	
coccineum Sibth . .	30	150		venustum Sweer. . .	50	—	
" flore pleno	50	—		vulgare Gaerntn.			
macrophyllum Willd.	20	—		" flore luteo pleno	50	—	
Gladiolus, Irideae,				" " coccineopl.	50	—	
Schwertlilie.				Helianthus, Comp.-Heli-			
Brenchleyensis leuchtend				antheae, Sonnenblume.			
scharlach, das schönste				decapetalus L. . . .	20	—	
zu Gruppen	10	80		giganteus L.	20	—	
floribundus	10	60		multiflorus L. fl. pleno	50	—	
gandavensis - Hybriden				strumosus L.	20	—	
Rummel I.	10	100		trachelifolius Willd. .	20	—	
" II.	8	60		" foliis varieg.	30	—	
Zwerg. Zur Topfkultur				tuberosus L.	20	—	
ausgezeichnet . . .	10	100		Topinambur.			
Gillenia, Rosaceae.				Helenium, Comp.-Heli-			
trifoliata Mönch. . .	30	—		antheae.			
(Spiraea trifoliata L.)				autumnale L.	20	—	
Globularia, Globulariaceae,				californicum	20	—	
Kugelblume.				pumilum Willd. . . .	20	—	
Δ vulgaris L.	40	—		Heliopsis, Compositae-			
Gnaphalium, Comp Gna-				Heliantheae.			
phalieae, Ruhrfrant.				laevis Pers.	20	—	
magaritaceum L. . .	20	100					
Die reinweißen Blüten sind für							
Winterbequets sehr werthvoll.							

	à St. à Dtz.			à St. à Dtz.	
	Pf.	Bf.		Pf.	Pf.
Helleborus, Ranuncula- ceae, Nießwurz.			Δ* Hepatica, triloba	Chair. 20	100
* abschasicus A. Br.	50	300	(Anemone hepatica L.)		
Prächtig, dunkelpurpurroth.			Δ* triloba flore alba	20	150
atrorubens W. et K.	30	200	Δ* " " cœruleo pl. —		
angustifolius Hort.	20	150	Δ* " " rubro	20	100
cupreus Hort.	20	150	Δ* " " " pleno 30	200	
foetidus L.	20	150			
graveolens Hort.	2	150	Heracleum, Umbelliferae.		
hyemalis siehe Erantli.			villosum Fisch.	50	—
intermedius Hort.	20	150	(giganteum Fisch.)		
lividus Ait.	20	150	Wilhelmssii Fisch.	50	—
* niger L.	20	150	eminens	—	—
Christblume, blüht oft schon zu			Decorative Blattpflanzen		
Weihnachten.					
niger grandiflorus	40	—	Hesperis, Cruciferae,		
T* olympicus Lindl.	40	—	Nachtviole.		
Reiß, großblumig.			matronalis L.	10	50
pallidus	20	150	" flore albo 20	80	
purpurascens	40	250	" fl. albo pleno 30	300	
species Abschasiae siehe			tristis L.	20	150
abschasicus			Wahre Nachtviole.		
viridis L.	20	150			
Helonias, Melanthaceae,			Heuchera, Saxifrageae.		
Schwindblume.			Δ americana L.	30	—
T* bullata L.	50	—	Δ caulescens Pursh	30	—
Keine zierliche, hellrothe Blumen			Δ divaricata Fisch.	30	—
eiförmiger Aehre, liebt feuchten			Δ mycrantha Dougl.	30	—
Standort			Δ rubra	30	—
			Δ Richardsonii R. Br.	30	—
			Δ villosa Mchx.	30	—
Hemerocallis, Hemero-			Hibiscus, Malvaceae,		
callideae, Taglilie.			Sibirisch.		
chinensis Hort.	30	—	palustris L.	60	—
Middendorffiana Tranto					
dunkelgelb	30	—	Horminum.		
(Dumortieri Morr.)			pyrenaicum L. siehe		
flava L. goldgelb	30	—	Melissa pyr.		
fulva L. hochorange	30	—	Hoteia, Rosaceae Spiraea-		
" foliis variegatis 40	—		ceae.		
" flore pleno	30	—	japonica Lieb.	20	200
Quanso foliis variegatis —	—		100 Stück —	500	
			(Spiraea japonica).		
Hepatica, Ranunculaceae,			Hyacinthus.		
Leberblümchen.			belgicus Hort. siehe		
Δ* angulosa Dec.	30	—	Scilla cernua.		
(Anemone angulosa L.)			botryoides L. siehe		
Großblumiges ungarisches Leberbl.			* Muscari racemosum.		

	à St. à Dtz.	
	Pf. Pf.	
Hyacinthus.		
monstrosus L. siehe		
Muscari comosum.		
candicans, blühbare		
Zwiebeln . . .	£0 —	
schwächere . . .	25 —	
Plüthschaft 1 m. hoch mit		
großen weißen für Bouquetbinderei		
im Sommer sehr verwendbaren		
Plüthen.		
orientalis L. . .	20—60 —	
In einfachen und gefüllten Zer-		
ten Anfang September		
Hypericum, Hypericineae,		
Johannisraut.		
Androsæum L. siehe		
Androsæum offic.		
* calycinum L. . .	30 —	
Prächtig großblumig.		
Hyssopus, Labiatae, Hop.		
officinalis L. . .	10 30	
Iberis, Cruciferae, Schle-		
isenblume.		
corifolia Sweet. . .	— —	
Δ* Garrexiana All. . .	30 —	
sempervirens L. . .	20 —	
Dunkel blühende weiße Früh-		
jahrblumen.		
Inula, Comp.-Veroniaceae,		
Alant.		
Helenium L. . .	30 —	
verbascifolia Poir. Desf.	30 —	
Iris, Irideae, Schwertlilie.		
(Das Irisfortiment ist revisions-		
bedürftig.)		
acuta Willd. . . .	20 100	
* amoena Red. = plicata.		
arenaria W. K. . .	30 150	
* aurea Link. = Gilden-		
staedtiana		
* biflora L. . . .	30 150	
conglomerata . .	30 150	
constantinopolitana		
Hort. Cremm. . .	20 100	
florentina L. . . .	30 200	
Liefert die z. eisenwurzel.		
formosa Hort. . .	30 200	
* foetidissima L. fol. var.	30 —	

	à St. à Dtz.	
	Pf. Pf.	
Iris, fragans Salisb. =		
subbiflora.		
germanica L. . .	20 100	
„ flore albo	20 100	
graminae L. . . .	20 100	
Gildenstaedtiana Bbrst.	20 200	
„ varietas	20 200	
haematophylla Fisch	20 100	
halophylla Pall. . .	30 200	
hybrida halophylla ×		
coerulea	30 —	
iberica Stev. (Oncocy-		
clus)	50 —	
Auffallend schön, auch zur Topf-		
kultur geeignet.		
Kaempferi Sieb. . .	50 —	
„ varietas . . .	50 —	
Neue schöne japanische Art, ge-		
reicht am besten in Moorerde.		
laevigata Fisch. . .	— —	
maritima Mill. . .	30 200	
Matthioli Tausch. . .	30 200	
Monnierii Red. . .	30 200	
moraeoides Ker (Moræa		
iridioides L.) . . .	30 —	
notha Bbrst. . . .	30 200	
Schöne species vom Kaukasus		
mit blauen bartlosen Blumen.		
notha varietas . .	30 200	
nudicaulis Lam. . .	30 200	
pallida Lam. . . .	20 120	
(odoratissima Jacq.)		
Die Wurzel wird wie florentina		
benußt, Wohlgeruch noch stärker.		
plicata Lam. . . .	20 100	
pumila L. in 6 Farben	20 100	
„ nova	— —	
Wahrscheinlich aus pumila und		
olbiensis entstanden, Blum n		
größer und mannigfaltiger als bei		
pumila		
Pseudacorus L. . .	20 100	
„ varietas . . .	20 150	
Redouteana Spach .	30 200	
* sambucina L. . . .	20 100	
* sibirica L. . . .	20 100	
* „ flore albo . .	20 100	
* „ variet. . . .	20 100	

	à St. à Dtz.			à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.		Pf.	Pf.
* <i>Iris</i> , sordida Willd. =			<i>Lappa</i> , Comp.-Cynareae,		
squalens.			Nette.		
* suaveolens	30	—	Kotschii	50	—
subbiflora Brst. . . .	30	—	Deferative Plattepfl. ngen.		
(fragrans Salisb.)			<i>Leucoium</i> , Amaryllidaceae.		
* spuria L.	30	180	Δ aestivum	30	—
* squalens L.	20	100	Δ vernum L. . . . ,	10	100
* „ variet.	20	120	Großes Schwertlilie.		
* susiana L. (Oncocyclus)	75	—	<i>Levisticum</i> , Umbelliferae,		
Eame in Trauer. Die schönste			Liebstöckel.		
aller <i>Iris</i> .			paludapifolium (Lmk.)		
* virescens Red. . . .	30	200	Aschs.	30	—
<i>Xiphium</i> L.	20	100	(officinale Koch, Ligu-		
Spanische Schwertlilie.			sticum Sevisticum L.)		
<i>Xiphioides</i> Ehrhr. . .	20	100	<i>Liatris</i> , Compositae,		
Englische Schwertlilie.			Prachtsparte.		
<i>Iris</i> in Hybriden			<i>T</i> spicata Willd. . . .	30	80
in prachtvollen Varietäten	20	200	<i>Ligularia</i> , Compositae-		
<i>Jeffersonia</i> , Papaveraceae.			Senecionidae.		
diphylla Pers. . . .	40	—	macrophylla Dec. (Ci-		
<i>Kitaibelia</i> , Malvaceae.			neraria macrophylla		
vitifolia Willd. . . .	20	—	Ledb.)	30	—
<i>Lactuca</i> , Compositae-Ci-			<i>Ligusticum</i> .		
choreae.			Leviticum L. siehe Le-		
perennis L.	30	—	visticum offic.		
virosa L ♂	20	—	<i>Lilium</i> , Liliaceae, Sifen.		
<i>Lamium</i> , Labiatae, Taub-			auratum Lindl. 150 à 200	—	
nessel.			Goldsandlilie.		
Δ maculatum L. . . .	20	—	bulbiferum L. . . .	20	—
* Orvala L.	20	—	Feuerlilie.		
<i>Lathyrus</i> , Papilionaceae,			„ croceum	50	—
Platterbsen.			Brownii	200	—
* grandiflorus Sibth. .	30	150	canadense L. . . .	—	—
cirrhusus Sering . . .	30	—	candidum L.	10	100
het rophyllus L. . . .	30	—	„ flore pleno . . .	75	—
* latifolius	30	—	„ fol. aur. var. . .	100	—
* „ flore albo	30	—	carniolicum Bernh. .	—	—
* „ flore roseo	50	—	chalcadonicum L. . .	50	—
* rotundifolius Willd.	30	250	scharlachrother Türken-		
* sanguineus Haberl. .	30	—	bund		
(pisiformis L.)			chalcadonicum flore		
sylvestris L.	30	—	coccineo	100	—
tuberosus L.	30	—	concolor Salisb. . .	—	—
			dalmatinum	—	—

	à St. à Dtz.			à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.		Pf.	Pf.
Lilium, davuricum Ker. 100	—	—	Linosyris, Compositae.		
giganteum Wallisch. —	—	—	vulgaris Dec.	20	150
Humboldtii	—	—	(Chrysocoma Linosyris L.)		
isabellinum siehe testa-			Linum, Lineae, Sein.		
ceum.			nervosum Waldst. Kit. 20	—	—
lancifolium f. speciosum.			perenne L.	20	—
longiflorum Thb.	50	—	Lippia, Verbenariae.		
Martagon L. Türfenbund 30	200	—	rodiflora Rich.	30	—
„ flore albo	40	—	(repens Spr.)		
„ „ splendido 50	—	—	Lobelia, Lobeliaceae.		
„ „ pleno	60	—	T* fulgens Willd.	40	—
Michauxii	—	—	T* „ Queen Victoria 50	—	—
pensylvanicum Gwl. f.			Zur Bezeichnung von Gruppen		
davuricum.			ausgezeichnet.		
phyladelphicum L.	—	—	Lunaria, Cruciferae,		
speciosum Thunb.	—	—	Mondblume.		
(lancifolium Hort.)			biennis Mönch	20	—
„ album			rediviva L.	30	—
(Brussartii) 100	—	—	Lupinus, Papilionaceae,		
„ album co-			Lupine.		
rymbiflorum 100	—	—	* grandifolius Don.	30	—
„ punctatum 75	—	—	* perennis L.	30	—
„ roseum ver. 60	—	—	* polyphyllus Dougl.	20	100
„ rubrum	50	—	In verschiedenen Varietäten		
„ Schrymakersii 50	—	—	Lychnis, Caryophylleae,		
Scovitzianum Fisch. 200	—	—	Sichtnelke.		
(colchicum).			Δ* alpina L.	30	—
Takesima	100	—	Rafenbildend mit leuchtend rothen		
testaceum (Isabelli-			Blumen		
num)	100	—	* chalcedonica L.	20	100
tenuifolium Fisch.	—	—	Brennende Liebe.		
Thunbergianum Schult. 50	—	—	* chalcedonica flore albo 20	120	—
„ aureum			* do. fl. albo pl. —	—	—
nigro-maculatum	50	—	* do. fl. carneo 20	100	—
tigrinum Gawl.	30	—	* do. pl. major 30	180	—
„ flore pleno 150	—	—	T* diurna Sibth. siehe		
umbellatum Pursh. 50	—	—	Melandrium.		
Randelaberkstie.			* hybrida Haageana	40	—
„ incom-			* fulgens Fisch.	40	—
parabile	50	—	* Viscaria L.	10	—
Washingtonianum	—	—	* „ flore pleno	20	100
Eißberstie Californens.			* „ „ albo	30	—
Linaria, Scrophularineae,			* „ splendens	30	180
Frauenfuchss.					
Cymbalaria Willd.	20	100			
pilosa Dec.	20	—			

	à St. à Dtz.			à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.		Pf.	Pf.
Lysimachia , Primulaceae, Gefhweiderich.			Merendera , Colchicaceae.		
ciliata L.	20	—	sobolifera Fisch. et		
punctata L.	20	—	Meyer	50	—
verticillata L.	20	—	Meum , Umbelliferae.		
Lythrum , Lythriaceae,			athamanticum Jacq.	50	—
Weiderich.			Mitella , Saxifrageae,		
acuminatum = virga-			Bischofsapfel.		
tum Willd.			diphylla L.	30	—
myrtifolium Sweet.	30	—	Molinia , Gramina.		
ramosissimum	30	—	* cœrulea Mönch. foliis		
* roseum superbum	30	180	variegatis	10	100
Salicaria L.	20	120	Ein sehr zierendes, hartes bunt-		
tomentosum Mill.	30	—	blättriges Gras, das auch für		
* virgatum L.	20	120	Teppichbeete verwendbar, nicht		
Maclaya , Papaveraceae.			Feuchtigkeit.		
cordata R.-Br.	50	—	Monarda , Labiatae.		
(Bocconia cordata Willd.)			dydyma L.	20	150
" japonica	50	—	Moraea .		
Sehr dekorative Blattspitzen			iridioides L. siehe Iris		
mit blaugrauer Belaubung.			moraeoides.		
Mazus , Scrophulariaceae.			Morina , Dipsaceae.		
Pumilio R.-Br.	20	—	longifolia Wall.	100	—
Keigene Miniaturpflanze.			Muscari , Asphodeleae,		
Malva .			Traubenhyacinthe.		
moschata fl. albo	30	—	racemosum Willd.	10	100
Melandrium .			(Hyacinth. belgicus Hrt.)		
rubrum Gke.	40	—	comosum Mill.	15	80
(Lychnis diurna Sibth.)			(Hyacinth. monstrosus L.)		
Melissa , Labiatae, Melisse.			Myosotis , Boraginaceae,		
Browniana	20	—	Bergißmeinnicht.		
Δ grandiflora L.	30	—	alpestris Schmidt	10	50
pyrenaica Jacq.	30	—	" flore albo	10	50
(Horminum p.)			" nana cœrulea	10	50
Melittis , Labiatae, Im-			" " fl. albo	10	50
menblatt.			" " " roseo	10	50
* Melissophyllum L.	30	—	Elise Fonrobert	20	—
Mentha , Labiatae, Minze.			Kaiserin Elisabeth	20	—
balsamea Willd. foliis			Zwei ausgezeichnete Reueiten.		
variegatis	20	100	dissitiflora, blüht früher		
crispa L.	20	80	als alpestris, prächtig	10	60
sylvestris L.	10	50	palustris L. semper-		
(viridis L.)			florens	20	200

	à St. à Dtz.	
	Pf.	Bf.
Narcissus , Amaryllidaceae, Narzisse.		
biflorus Curt. . . .	10	60
Bulbocodium L. . . .	30	200
incomparabilis Curt. .	05	40
montanus Ker. siehe poculiformis.		
Orange Phoenix . . .	10	80
van Sion	10	60
poculiformis Salisb. .	10	60
poeticus L.	05	20
„ flore pleno	10	100
radiiflorus Salisb. . .	10	60
Nardosmia , Comp. Eupatoriaceae.		
fragrans Rchbch. . . .	20	150
(Tussilago fragrans Will.)		
Nepeta , Labiatae, Katzenminze.		
azurea R.-Br.	20	120
camphorata Bieberst. .	20	120
Nertera , Rubiaceae.		
T* scaparioides Lang. .	30	—
(N. depressa Hort.)		
Steigende Miniaturpflanzen mit korallenrothen Beeren ganz bedeckt.		
Oenothera , Onagraceae, Nachtkerze.		
* fruticosa L. major . .	30	200
pumila L.	20	100
serotina Sweet.	20	—
Omphalodes , Boraginaceae, Gartenvergiftweihnacht.		
* Luciliae, sehr schön .	—	—
* verna Mönch.	10	50
* „ flore albo	—	—
Ononis , Papilionaceae, Sauhedel.		
* rotundifolia L.	40	—
Origanum , Labiatae, Dost.		
vulgare L.	20	100
„ viride	20	100
„ foliis variegatis . . .	30	—

	à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.
Ophiopogon , Smilacaceae, Ratterzaufe.		
T spicatus Kerr. . . .	20	—
Orobis , Papilionaceae, Walserbse.		
aureus Steven.	30	—
* flaccidus Kit.	30	—
* galegiformis	40	—
* lathyroides L.	30	—
niger L.	30	—
sylvaticus L.	30	—
varius Solander.	40	—
* vernus L.	30	180
* „ flore albo	50	—
* „ „ azureo	40	—
Orontium .		
japonicum Thunb. siehe Rohdea japonica.		
Oxalis , Oxalideae.		
* Lasiantha Zucc. . . .	10	100
* tetraphylla Car. . . .	10	100
* vespertilionis Zucc. .	10	100
Gütsche Einfassungs-Pflanzen.		
Uebernwinterung der Knollen trocken und frostfrei.		
Oxytropis , Astragaleae.		
argyrea Dec.	40	—
Pachysandra , Euphorbiaceae.		
T* terminalis foliis var. .	50	—
Gütsche Teppichpflanze.		
Paeonia , Ranunculaceae, Pfingstrose.		
Das Paeonienfortiment ist reichlich bedürftig.		
arboorea Don. siehe Moutan.		
Baxteri Sabin.	100	—
corallina Retz.	100	—
„ purpurea	100	—
commutata Wender . . .	60	—
decora Andr.	50	—
edulis Salisb. (albiflora).		
„ chrysanthemi-flora	100	—

		à St. à Dtz.				à St. à Dtz.	
		Pf.	Pf.			Pf.	Pf.
Paeonia , edulis Comte de				* Paeonia , paradoxa rosea	50	—	
Paris	100	—		* peregrina Mill. . .	30	—	
edulis Duchesse				* „ bizanthina	50	—	
d'Orleans . . .	100	—		* „ compacta	50	—	
„ formosa . . .	100	—		* „ Grewillii . . .	50	—	
„ General Bertrand	100	—		* „ Russii . . .	80	—	
„ grandiflora . .	80	—		* pubescens . . .	50	—	
„ lilacina plenissima	150	—		* tenuifolia L. . . .	30	200	
„ Lowii	150	—		* „ flore roseo	50	—	
„ Napoleon . . .	100	—		* „ „ pleno	100	—	
„ Non plus ultra	100	—		„ insignis . . .	50	—	
„ odorata . . .	100	—					
„ papaveracea . .	100	—		Panercatium , Amaryllideae.			
„ Pottsii	60	—		T* illyricum L. . . .	50	—	
„ prolifera tricolor	100	—		Dieses sehr schöne Zwiebelgewächs verlangt eine Mischung von Laub-, Heide-, Mistbeeterde und scharfen Sand. Die Beete werden 1/2 Fuß hoch mit Niefelnadeln gedeckt.			
„ plenissima roseo				Papaver , Papaveraceae,			
superba	100	—		Mohn.			
„ Queen Victoria	100	—		* bracteatum Lindl. . .	20	—	
„ Reevesii . . .	100	—		Δ caucasicum Bbrst. ♂	20	—	
„ Rose de Gand-				involucratum . . .	20	—	
brügge	100	—		Δ nudicaule L. . . .	20	—	
„ speciosa striata	100	—		orientale L. . . .	20	—	
„ tricolor grandifl.	150	—		pilosum Sib. Sm. . .	20	—	
„ Triomphedu Nord	100	—					
„ variegata . . .	100	—		Pardanthus , Irideae,			
„ Witleyi	50	—		Farbnelbume.			
Eustemonia . . .	100	—		* chinensis Ker. . . .	50	—	
humilis Retz. . .	30	—		(Moraea chinensis Thunb.)			
„ flore pleno . .	30	—		Sehr schön, leuchtend scharlachroth blutroth getigert, hält unter geringer Decke aus.			
„ lobata	40	—		Parthenium , Compositae,			
intermedia C. A. Meyer	50	—		integrifolium L. . .	30	—	
* microcarpa Salm. .	30	—					
Moutan Sims. (arborea				Paronychia , Amarantha-			
Don.)	150—300	—		ceae.			
* officinalis Retz. Willd.				serpillifolia Dec. . .	30	—	
(simplex)	30	—		(Illecebrum serp. Vill.)			
„ simplex rosea	30	—		Zur Bekleidung von Felspartien, zierliche Kriecher.			
„ anemonaeflora	40	—		Passiflora , Passifloreae,			
„ alba plena . . .	30	—		Passionsblume.			
„ carnea plena	50	—		T* incarnata L. schön! . .	—	—	
„ foliosa Catal.							
Booth. . . .	30	—					
„ purpurea plena	—	—					
* paradoxa Andr. san-							
guinea	50	—					
* paradoxa fimbriata .	50	—					

	à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.
Pennisetum , Gramina.		
T* longistylum Hochst.	20	150
Sehr dekoratives Gras für Bouquets gut verwendbar, frosthrei zu überwintern.		
Pentastemum , Scrophulaceae (Pentstemum).		
Digitalis Nuss . . .	30	—
speciosum Dougl. . .	40	—
Phalaris .		
arundinacea L. foliis variegatis f. Digraphis.		
Phlomis , Labiatae, Stammenlippe.		
* Russeliana Lagasc. . .	40	—
Samia L.	20	—
tuberosa L.	20	—
Phlox , Polemoniaceae, Stammenblume.		
Niederliegende Phlox.		
pilosa L.	10	150
Rebsoni, weiß . . .	10	100
setacea L.	10	150
„ atropurpurea . .	—	—
subulata L.	10	100
verna L.	20	150
Hohe Phlox.		
a. suffruticosa Vent.		
Schmalblättriger Phlox.		
Adonis maculata.		
b. acuminata Pursh.		
(decussata l yoni)		
Breitblättriger Phlox.		
Ältere Sorten:		
Triomphe de Twickel violett, weiß gestreift.		
Virgo Maria reinweiß.		
Maréchal Caillard, leuchtend anilinroth; dunkles Auge.		
Mad. Caillard, salmrosa, dunkelpurpur Auge.		

	à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.
Beste Sorten von 1877:		
E. Legouve, bläulich schieferfarben, Auge dunkelviolett.		
Jules Ferry, dunkelmohnviolett, helles Auge.		
M. Defond, blendendroth, Auge lebhaft purpur.		
Pictet de la Rive, schön, schneeweiß, frühblühend.		
York & Lancaster, violett, weiß bespritzt, Petalen weiß gerundet.		
Tyrolien, weiß, violett amant gestreift.		
Beste Sorten von 1878:		
Artaban, kupfrig orange, Auge purpur.		
Bradamante, lebhaft salmfarbig, Auge violett.		
Caucase, porzellanweiß, Auge mohnfarben.		
Durandal, bläulich lila.		
Jason, dunkelrosa, Auge purpur.		
La fille de Rolande, mattweiß mit Karmin.		
Madame Pauchet, purpur mit violettrosa.		
Purpre de Sidon, lebhaft purpur.		
Roman, purpur, Auge karmoisin.		
Pfitzer'sche Züchtungen von 1880:		
Mad. Boissier Naville, zinnoberkarmin, Auge amarant.		
Franz Buchner, karminviolett, Auge blutroth.		
Frau Marie Kapf, alabasterweiß, Auge amarant.		
Frau Marie Eisenlohr, schneeweiß, Auge karmin.		

	à St. à Dtz.			à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.		Pf.	Pf.
Phlox, Pfitzerſche Züchtungen			Potentilla, atropurpurea		
Prälat von Müller, hellvio-			Lodd.	30	—
olettroth, Auge karmin.			atrosanguinea Don. .	30	—
Emil Hoesch, roſa, Auge			minima Hall K. . .	20	—
amarant karmin.			(Brauneana Hopp.)		
Von dieſem ausgewählten Sorti-			ochreata Lindl. in Wall.	20	—
ment erlaſſe ſoweit Vermehrung			pulcherrima Lehm. .	30	—
vorhanden zum Frühjahr das 2 Stück			reticulata	20	—
mit 50 Pf.			striata formosissima	30	—
Physalis, Solaneae, Zuden-			Potentilla Hybriden		
denfirſche.			(alle *)		
Alkekingi L.	20	—	amabilis picta		
Phytolacca, Phytolac-			Antwerpensis purpurea		
ceae, Kermesbeere.			eximia resplendens		
decandra L.	30	—	fulgida Russeliana		
esculenta	30	—	Fintelmanni speciosa		
Platycodon, Campanulaceae.			Lucia spectabilis		
grandiflorum Dec. fil. 50	—		marginata Smouthii		
(Campanula grandifl. L.			pro Stück	30	300
Wahlenbergia grandiflora			Primula, Primulaceae .	—	—
Schrad)			* acaulis Jacq. lilacina	30	—
grandifl. flore caeruleo			* „ amarantina . . .	30	—
pleno 60	—		* alba plena	60	—
„ „ albo pl. —	—		* lilacina plena . . .	50	—
Polemonium, Polemoni-			* lutea plena	50	500
ceae, Sperrkraut.			* purpurea plena . . .	60	—
boreale Adams	20	—	* Auricula L. Garten-		
(humile Willd.)			aurikel, Guyfer,		
caeruleum L.	20	100	Rangblumen	20	150
„ flore albo 20	100		Auricula L. flore pleno	50	—
„ foliis varieg 20	100		auriculata Ledeb. . .	—	—
Polygala, Polygalaceae,			„ luteola, gelbblühend,		
Kreuzblume.			Primel aus dem Kau-		
Δ* Chamaebuxus L.	50	—	kaſus	40	—
Polygonum, Polygoneae,			Δ* cortusioides L. . . .	30	200
Rüsterich.			* „ amoena		
* Bistorta L.	20	100	(grandiflora) 50	—	
cuspidatum S. et Zucc 10	80		„ flore albo 50	—	
(Sieboldii Hort.)			„ lilacino 50	—	
pictum	20	—	denticulata Sm.	50	—
sacchalinese	30	—	Sehr dankbar blühend zur Früh-		
Potentilla, Rosaceae, Zin-			treiberei geeignet.		
gerkraut.			elatior Jacq. in prächtigen		
Δ alba L.	20	—	Varietäten.		
			Schof 3 Mf.	10	100

	à St. à Dtz.			à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.		Pf.	Pf.
Primula, varietas duplex.			Pyrethrum, corymbosum		
Hoje in Hoje . . .	25	250	Willd.	20	—
integrifolia L. . .	40	—	macrophyllum Willd.	20	—
japonica A. Fray . .	50	—	* roseum Bbrst. . .	30	—
„ alba . . .	—	—	* „ Delhayi . . .	30	—
„ splendida . . .	—	—	* „ Duch. de Brabant	30	—
Die purpurrothe japanische			* „ hybridum flore		
Prinzel ist eine der besten			pleno in dichtgefüllten		
neueren Einführungen und			nachstehenden 6 Sorten:		
ganz winterhart.			à 50	—	
latifolia Lapeyr. . .	30	—	Beauté de Laeken, Mo-		
minima L.	30	—	dèle, Wilh. Pfitzer, Tri-		
Murretiana Moritz . .	—	—	omphe, P. Joume, Mad.		
veris L., in vielen pracht-			Bouharlat.		
vollen Varietäten.			roseum Lewisii variegatum	30	—
Schock 2 Mt.	10	50	* „ Mülleri . . .	30	—
Psoralea, Leguminosae,			parthenifolium aureum		
Harzflce.			(golden Feather).		
T* strobiliana Hook. .	40	—	Bekannt. Teppichpflanze	—	10
Parmica, Compos.-			serotinum Willd. . .	30	—
Achilleae.			Tanacetum L. . . .	20	—
alpina Dec.	20	100	tenuifolium Tenor f. Achillaea.		
(Achillea alp. L.)			Tschihadschewi . . .	10	80
nana Dec.	20	—	Ist zur Hervorbringung eines Rasenteppichs auf sterilem Terrain geeignet und findet auch als Tep- pichpflanze Verwendung.		
(Achillea lanata Lam.)					
macrophylla Dec. . .	20	80	Ramondia, Primulaceae.		
(Achillea macroph. L.)			Δ* pyrenaica Rich. . .	50	—
Pulmonaria, Boragineae,			Ranunculus, Ranuncula-		
Lungenkraut.			ceae, Hahnenfuß.		
* mollissima	50	—	aconitifolius L. . .	30	—
Δ officinalis L. . . .	20	—	„ flore pleno	40	—
saccharata Mill. . .	20	—	acer L. flore pleno	20	100
(mollis Wolff)			chaerophyllus L. . .	30	—
* virginica L.	40	—	Ficaria L. flore pleno		
Eine der schönsten Stauden.			f. Ficaria ranunculoides.		
Pulsatilla, Ranunculaceæ.			lanuginosus L. flore pleno	20	100
alpina Spr., Teufelsbart	40	—	pyrenaicus L. . . .	50	—
montana Rehbch. . .	40	—	Δ plantagineus All. .	50	—
vulgaris Mill. . . .	40	—	repens L. flore pleno	10	60
Pyrethrum, Compos. An-			speciosus flore pleno	50	—
themideae, Bertramsw-			asiaticus L.	05	50
wurz.			Gefüllte Gartenranunkeln		
atrosanguineum . . .	30	—	(Schottische, Türkische)		
carneum Bbrst. . . .	30	—	„ superbissimus	08	60

	à St. à Dtz.		à St. à Dtz.
	Pf. Pf.		Pf. Pf.
Rhaponticum , Compos.		Salix , Amentaceae, Weide.	
Cynareae.		Δ herbacea L. . . . 40 —	
cynaroidis Less. . . . 50 —		Δ retusa L. 40 —	
(Carduns inermis Pers.)		Δ var. serpyllifolia Scop. 30 —	
scariosum Lam. . . . 50 —		Salvia , Labiatae, Salbei.	
(Centaurea rhapontica L.)		Sibthorpii Smith. . . 20 —	
Rheum , Polygoneae, Rha-		(campestris Bbrst.)	
barber.		virgata Ait. 30 —	
australe Don. . . . 50 —		(rubra Sprg.)	
(Emodi Wall.)		Sanguinaria , Papavera-	
Die Blätter treiben sehr spät		ceae, Blutfraut.	
und kupferroth aus und haben eine		canadensis L. . . . 30 —	
prächtige Herbstfärbung.		Sanguisorba , Rosaceae,	
cripum Andr. . . . 50 —		Wiesenknopf.	
macroleprium . . . 50 —		auriculata All. Scop. =	
macrorrhizon . . . 50 —		officinalis.	
officinale Baillon . . — —		dodecandra Morett. 30 —	
Chinesischer Rhabarber mit		officinalis L. 20 —	
großen sehr distincten Blättern,		tenuifolia Fisch. Link. 30 —	
junge Samenpflanzen . . . 60 —		Saxifraga , Saxifrageae,	
palmatum L. typicum		Steinbrech.	
Junge Samenpflanzen 60 —		(Alle Δ.)	
" tanguticum		Aizoon L. 30 —	
" Kgl. Ver.		acanthaefolia . . . 20 —	
Junge Samenpflanzen 60 —		angustifolia Hort. =	
Tibetanischer Rhabarber mit d-		hypnoides.	
istinten bandförmigen Blättern.		caespitosa L. 20 —	
Die neu eingeführten Rheum		ceratophylla Ait. . . 20 —	
off. un palm. tanguticum sind		cordifolia Haw. . . . 30 —	
außer ihrem medizinischem Werth		crassifolia L. 50 —	
auch Blattpflanzen ersten Ranges.		decipiens Ehrh. . . . 20 —	
undulatum L. . . . 50 —		elatio Mert. Koch =	
var. Queen Victoria 50 —		Hostii.	
Der beste für die Küche.		exarata Vill. 20 —	
Rhodea , siehe Rohdea.		geranioides Hort. =	
Rhodiola rosea L. siehe		petraea.	
Sedum Rhodiola L.		Geum L. 20 —	
Rohdea , Acorninae.		Hostii Tausch. . . . 20 —	
japonica Roth . . . 20 —		hypnoides L. 10 30	
(Orontium japonicum		longifolia Lapeyr. . . 30 —	
Thunb.)		media Gouan. 30 —	
Rudbeckia , Comp.-Heli-		muscoides Wulf. . . 20 —	
antheae.		nivalis L. 20 —	
* fulgida Ait. 30 180		oppositifolia L. . . . 30 —	
Rubus , Rosaceae.			
Δ arcticus L. 40 —			

		à St. à Dtz.				à St. à Dtz.	
		Pf.	Pf.			Pf.	Pf.
Saxifraga, Parnassii		20	—	Sedum, elongatum Wall.		30	—
pedatifida Ehrh.		20	—	Ewersii Ledeb.		30	—
petraea L. (Ponæ Sternb.)				Fabaria Koch		30	—
punctata		20	—	Forsterianum Smith.		30	—
rotundifolia L.		20	—	hybridum L.		20	—
T	sarmentosa L.	20	—	ibericum St.		20	—
	Schraderi Sternb. =			involutum Bbrst.		20	—
	hypnoides	20	—	Kamtschaticum F. et K.		30	—
	serrata Link.	20	—	maximum Hoffm.		30	—
	spalululata Desf.	20	—	neglectum Tenor		20	—
submutica Hort. S. =				ochroleucum Smith. =			
Aizoon.				altissimum.			
umbrosa L. Schf 1,25 M. 10		30		oppositifolium Sims.		20	—
Scabiosa, Dipsaceae,				pallidum Bbrst. = rubens.			
Stabiose.				populifolium L.		20	—
caucasica Bbrst.		30	—	pulchellum Michx.		30	—
" connata		30	—	(pulchrum Dec.)			
elata Hornem.		30	—	purpureum Link.			
Grammuntia L. = Ce-				(Fabaria Hort.)		30	—
phalaria tatarica R. S. 20		100		rubens L.		20	—
Δ*	gramminifolia L.	40	—	Telephium L.		20	—
	* succisa L.	30	—	Sempervivum, Crassula-			
Scilla.				ceae, Saushwur.			
* amœna L.		10	50	(Alle Δ).			
* bifolia L.		10	50	acuminatum Schott.			
* cernua Hfm. (Hyacinth.				alpinum Griseb.			
belgicus)		20	—	arachnoideum L.		20	—
* sibirica Ardrews		10	60	arenarium Koch.			
Scutellaria, Labiatae,				assimile.			
Helmkraut.				avernense.			
* alpina L.		30	—	bulbulatum Schott.			
(variegata Spr. fl.)				Boutingianum.			
peregrina L.		20	—	Braunii Funk.			
viscida Sprgl. fl.		30	—	Comonolli.			
Sedum, Crassulaceae,				calcareum Jord.			
Mauerpfeffer.				(californicum Hort.)			
(Alle Δ.)				cornutum.			
acre L.		10	—	dolomitum.			
Aizoon L.		20	—	fimbriatum Klotzsch.			
album L.		20	—	(globiferum L.)			
altissimum Poir.		20	—	Funkii Braun.			
Anacampteros L.		20	—	glaucum Tenor.			
T	dasyphyllum L.	30	—	globuliferum.			
	elegans Lejeun. = reflexum.			Hausmanni.			
				hirtum L.			
				heterotrichum.			

	à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.
Sempervivum, Heuffelii.		
Laggeri	20	100
majus Neck = montanum.		
Mettenianum Lehm et Schnittsp.		
Metteanum.		
montanum L.		
„ Blasii.		
Neilreichii.		
Noltei.		
„ patens.		
penicillatum.		
Pittonii.		
piliferum.		
Reguienii.		
ruthenicum.		
spinosum Thumb.	20	—
(Umbilicus.)		
soboliferum Sims.		
tectorum L.		
„ vom Jura.		
tomentosum	20	100
triste	20	100
Transsylvanicum.		
violaceum.		
„ Blasii.		
Verlotii.		
Wulfenii Hoppe.		
sp. von Helvetia.		
Von vorstehenden Sempervivum erlassen wir das Stück mit	10	50
Senecio, Comp. Jacobae,		
Kreuztraut.		
alpinus Scop	20	—
Doria L.	20	—
tetrandus Dec.	20	—
(cordatus Wall.)		
Sibbaldia, Rosaceae.		
ΔT cuneata	30	—
Silene, Caryophylleae,		
Leimfraut.		
alpestris Jacq.	20	120

	à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.
Silene, fimbriata Sims.		
Δ* inflata Smith. fl. pl. — —		
(maritima With. Sm.) — —		
T* orientalis Mill. δ	30	—
pendula	10	50
„ ruberrima	10	50
Δ Saxifraga L.?	30	—
Zawadzkii Herbich	20	—
Silybum, Compositae-		
Cardui, Mariendistel.		
eburneum	20	—
Silphium, Compositae-He-		
liantheae.		
erythrocaulon Bernh.	30	—
laciniatum L.	50	—
Die nordamerikanische Kompasspflanze. Die schönen geweihartig gekrümmten Blätter nehmen theils eine horizontale theils eine vertikale Stellung an, woraus die Jäger der Prärien die Himmelsrichtung erkennen wollen		
— perfoliatum L.	30	—
Sisymbrium, Cruciferae.		
austriacum Jacq.	20	—
(multisiliquosum Hoff.)		
Sisyrinchium, Irideae,		
Schweinsrüssel.		
* anceps Lam.	30	200
T Bermudianum L.	50	—
T* californicum Spr.	50	—
reticulatum	50	—
sehr starkwüchsig.		
striatum Smith.	50	—
sehr starkwüchsig.		
sulphureum	50	—
Zierliche Einfassungspflanzen, auch zur Topfkultur geeignet, californicum hat auffallend große gelbe Blumen und blüht bis in den Herbst.		
Smilacina, Smilaceae.		
— stellata Desf.	40	—
Soldanella, Primulaceae,		
Alpenglöckchen.		
Δ* alpina L.	50	—
Δ* montana Willd.	50	—
Reizende Frühjahrseblumen.		

	aSt.	aDtz.
	Pf.	Pf.
Solidago, Comp.-Asteræ, Goldruthje.		
acuta	20	—
altissima L.	20	—
* bicolor L.	30	—
canadensis L.	30	—
elliptica Ait.	30	—
grandiflora Desf.	30	—
(lanceolata Ait.-Michx.)		
lateriflora Rafin.	30	—
livida Willd.	30	—
paniculata Dec.	20	—
procera Ait.	20	—
recurvata Willd.	30	—
* Shortii Torr. et Gr.	20	—
serotina Ait.	20	—
Virgaurea L.	20	—

Sonchus, alpinus siehe
Mulgedium alpinum.

Spiraea, Rosaceæ, Spier-
staude.

* acuminata	20	—
* Aruncus L.	30	—
* „ glomerata	40	—
* „ rubella	40	—
camschatica Pali.	20	—
caucasica	20	—
filipendula L.	20	—
* „ flore pleno	30	300
* „ nana fl. pl.	30	—
Humboldtii	30	—
* japonica Sieb.	20	150
(Holteia japonica.) % 10 M.		
* palmata Thumb.	60	—
die schönste unter den roth-		
blühenden.		
trifoliata siehe Gillenia.		
Ulmaria L.	20	—
* „ flore pleno	30	—
* „ foliis variegatis	30	—
* venusta O. et D.	40	240
Sehr schön, rosa.		

Stachys, Labiatae, Ziest.

grandiflora E. Meyer	20	—
lanata Jacq.	20	—

aSt. aDtz.
Pf. Pf.

Stachys, longifolia Benth. 20 —
* speciosa Hook. siehe
Gardoquia elliptica.

Statice, Plumbagineæ,
Strandnelke.
(Alle *).

bellidifolia Dec.	30	—
eximia	50	—
Erinus L.	40	—
latifolius Smith.	40	300
Limonium L.	40	—
reticulata L.	40	—
scoparia Pall.	40	—
spathulata Desf.	40	—

Stenactis.

* speciosa Lindl. siehe
Erigeron spec.

Stevia, Compositæ-Eupa-
torineæ.

Eupatoria Willd.	30	—
Lindleyana	30	—
purpurea Willd.	50	—

Die Stevien müssen frostfrei
überwintert werden; sind für Bou-
quetbinderei sehr werthvoll.

Stipa, (Stupa) Gramina.

capillata L.	20	—
* pennata L. Federgras	30	—
splendens Trin.	30	—

Symphiandra, Campa-
nulacæ, Wandglocke.

* pendula Dec.	50	—
------------------------	----	---

Tagetes, Compos.-Tage-
teae, Studentenblume.

7* lucida Cav.	20	200
------------------------	----	-----

Mit wohlriechenden nach Anis
duftenden zierlichen Blüthen, für
Bouquetbinderei noch im Oktober
und November sehr verwertbar,
muß frostfrei durchwintert werden.

Tanacetum, Comp.-Anthe-
mideæ, Wurmkraut.

vulgare L. var. cris- pum	20	—
--	----	---

	à St. à Dtz.			à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.		Pf.	Pf.
Telekia , Compos.-Asteroideae.			Tricirtis , Liliaceae.		
cordifolia Dec.	30	200	hirta	—	—
(speciosa Bamg. Hook.)			„ fol. variegatis	—	—
Tellima , Saxifrageae			Trifolium , Papilionaceae,		
Δ grandiflora Lindl.	30	—	Mec.		
Teucrium , Labiatae, Gamander.			rubens L.	30	—
aureum Schrb.	10	100	„ flore albo	30	—
Zierliche silbergraue Teppichpflanze.			repens L. fol. atropurpureis	30	—
Chamaedrys L.	30	—	Trillium , Smolaveae,		
flavum	20	—	Dreiblatt.		
Polium L.	30	—	Δ* atropurpureum.		
Thalictrum , Ranunculaceae, Wiesnraut.			Δ* grandiflorum Salisb.		
alpinum L.	20	—	Keine Stauden für feuchte schattige Plätze.		
anemonoides Mcx.	20	—	Tritonia , siehe Crocosmia.		
angustifolium L.	20	—	Trollius , Ranunculaceae,		
aquilegifolium L.	20	—	Trollblume.		
concinnum Willd.	20	—	aconitifolium Hort. =		
Kochi	20	—	eucopaeus.		
lucidum Jacq.	20	—	* americanus Mhlbg.	40	—
minus	20	—	* atrobatensis	30	—
„ var. flexuosum	20	—	* aureus Tausch.	30	—
purpurascens L.	30	—	* europaeus L.	20	120
sibiricum L.	20	—	* „ flore albo	50	—
speciosum Mill. = lucidum.			* giganteus	30	—
spuarrosum Stephan	20	—	* orientalis	30	—
tuberosum L.	30	—	* orientalis	30	—
Thymus , Labiatae, Thymian.			* Smouthii	30	—
hirsutus Bbrst.	30	—	tauricus Hort. = europaeus.		
vulgaris L. fol. var.	30	—	Tulipa , Liliaceae-Tulipaceae, Tulpe.		
Tiarella , Saxifrageae, Spitzhütchen.			Gesneriana L.		
Δ cordifolia L.	10	50	100 Stück 4,50	10	60
Tigridia , siehe Ferraria.			G. monstrosa	10	80
Tradescantia , Commelineae.			Bapagei-Tulpen		
* virginica L.	20	120	Gefüllte frühe und späte		
* „ rubra plena	30	—	Tulpen	10	100
			Greigii	100	—
			silvestris L.	10	60
			(florentina odorata).		
			Tussilago , Comp.-Jacobeae, Huflattig.		
			Δ fragrans Vill. siehe Nardosmia fragrans.		

	à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.
Umbilicus, Crassulaceae.		
$T\Delta$ erectus Dec.	30	—
$T\Delta$ spinosus Dec.	30	—
Uniola, Gramina.		
latifolia Mchx.	50	—
Sehr dekoratives Stiergras	—	30
Uvularia, Melanthaceae,		
Bäpchenfräut.		
perfoliata L.	40	—
Valeriana, Valerianeae,		
Balbian.		
sambucifolia Mikan.	30	—
supina L.	30	—
tripteris L.	50	—
Veratrum, Melanthaceae,		
Germer, Nieswurz.		
Δ album L.	50	—
(Lobelianum Bernh.)		
Δ nigrum L.	50	—
Dekorative Stauden als Soli-		
tairpflanzen auf Rasen.		
Verbascum, Scrophulari-		
neae, Königsferze.		
phoeniceum L.	20	100
Sehr schön in weiß, rosa, violett.		
Veronica, Scrophularineae,		
Ehrenpreis.		
alpina L.	20	—
austriaca L.	20	—
Bachofenii Heuff.	30	—
Δ bellidioides L.	30	—
crenulata Hoffm.	30	—
corymbosa Hort. Lond.	30	—
* elegans Dec.	30	—
Δ fruticulosa L.	30	—
Δ gentianoides Sims.	20	100
glabra Ehrh. Schrad.		
= spuria.		
latifolia L.	20	—
maritima L.	20	—
pallida Hornem. =		
gentianoides.		
* pinnata L. Sehr schön.	40	—
Δ Ponaë Gouan.	30	—

	à St. à Dtz.	
	Pf.	Bf.
Δ Veronica, prostrata L.	20	—
Δ saxitilis L.	30	—
Schmidtii Röm. Schult.		
= Teucrium.		
spuria L.	20	—
suffruticosa	30	—
Teucrium L.	20	—
„ varietas incisa. — —		
virginica L.	—	—
„ var. incarnata	30	—
Vinea, Apocynaeae, Simu-		
grün.		
Δ herbacea W. K. Ampel-		
pflanze	10	30
Δ major L.	20	100
„ foliis variegatis	20	200
minor L.	10	30
„ foliis argenteo		
variegatis	20	100
„ flore albo	20	80
„ „ pallido	10	40
„ „ rubro pleno	20	80
Vincetoxicum, Asclepia-		
daceae.		
medium	—	—
Viola, Violaceae, Veilchen.		
Δ^* cucullata Ait. Ell.		
var. striata	20	—
(obliqua Ait.)		
odorata L.		
„ arborea fl. pl. — —		
„ Belle de Cha-		
tenay (Paillet) 50 —		
Neues acüßtes Treibveilchen		
mit sehr großen weißen Blumen,		
die schwach violett gerändert sind.		
„ flore coeruleo		
pleno	10	80
„ Kronprinzess		
von Deutsch-		
land (Göschke) 50 —		
Neueit vom Bismarckveilchen		
gezeugt, mit noch größeren pur-		
purviolettten Blumen.		

	à St. à Dtz.	Pf.	Pf.
Viola, Laucheana	10	80	
— Ein Bastard von rossica und semperflorens, vereinigt die guten Eigenschaften beider, ungemein reichblumig $\frac{1}{2}$ 8 Mark.			
— „ Lee's Victoria			
— „ Regina	15	100	
— Bismarckveilchen, gehört zu den größten bis jetzt bekannten Veilchen.			
— „ Marie Luise			
— „ flore pleno	—	—	
— „ rossica	15	120	
— Russisches Treibveilchen.			
— „ the Czaar	10	80	
Vittadenia, Compositæ.			
— triloba Dec.	—	—	
— Neu, mit bellissamen rötlichen Blumen, von Frühjahr bis Herbst blühend.			
Wahlenbergia.			
* grandiflora Schrad. f.			
— Platycodon.			
Waldsteinia, Rosaceæ.			
Δ geoides Willd.	20	100	
Δ trifoliata Koch.	10	50	
Wulfenia, Scrophularinæ.			
— carinthiaca Jacq.	40	—	
Xanthogalum.			
— purpurascens	—	—	
Xerophyllum, Junceæ,			
— Hartblatt.			
— setifolium Mchx.	—	—	
* (asphodeloides Spr.)			
— Ausgezeichnet, es sieht im Ansehen einem Dasylirion.			
Yucca, Coronariæ-Spathaceæ.			
— filamentosa L.			
— Trägt unsere norddeutschen Winter uneingebunden mit leicht-			

	à St. à Dtz.	Pf.	Pf.
ter Laubdecke auf den Wurzeln sehr gut, während sie eingebunden oft leidet. Als Solitärpfl. eine große Zierde der Rasenfläche. Blühbare Exemplare 0,75 à 1,5 Mk. Kleinere			50 Pf.

Zosimia, Umbelliferae.			
T absinthifolia Dec.	—	—	
— (Heracleum absinthifolium Vent.)			
— Einführung aus Persien, prächtige Solitärpflanze.			
— latifolia Ren, desgl.	—	—	

In pikirten Samenpflanzen sind abzugeben à Stück 20 Pfennig:

Asclepias tuberosa.	
Alyssum saxatile compactum.	
Amphicarpæa monoica.	
Andryale candidissima.	
Aster floribundus.	
Anisodes luridus.	
Anemone multifida.	
— „ Pulsatilla.	
Antirrhinum rupestre.	
Arabis alpina.	
Achillaea moschata.	
Ca'ananche candidissima.	
Datisca cannabina.	
Desmodium canadense.	
Geum coccineum atrosanguinum	
— flore pleno.	
Lychnis grandiflora gigantea	
Potentilla cataclines.	
Pentstemon Lobbii.	
— „ cordifolius.	
Peltaria angustifolia.	
Sedum Maximowiczii.	
Scrophularia chrysantha.	
Verbascum olympicum.	

Freilandfarne.

Die hier aufgeführten Freilandfarne bieten eine Auswahl des Besten und eignen sich ganz ausgezeichnet zur Bepflanzung von Felspartien, schattigen Abhängen oder sonst schattigen Stellen unter Bäumen, wo Gras nicht mehr fortkömmt. Mit Hilfe derselben kann man an sonst kahlen und hässlichen Stellen eines Gartens oder einer Parkanlage einen üppigen Pflanzenwuchs hervorbringen und dadurch den sonst vermiedenen Stellen einen ungewöhnlichen Reiz verleihen. Wir haben die Preise sehr billig gestellt um dadurch die allgemeinste Verbreitung dieser seither vernachlässigten Gewächse zu ermöglichen.

		à St. à Dtz.				à St. à Dtz.	
		Pf.	Pf.			Pf.	Pf.
Adiantum L. Haarfarn.				Blechnum L. Rippenfarn.			
pedatum L.	50	—		Spicant Wilh.	25	200	
Aspidium Sw. Schildfarn.				Zur Bekleidung feuchter, schattiger Stellen vorzüglich.			
erythrosorum	60	—		(Lomaria Spicant Desv.)			
Filix mas (L.) Sw.	30	—		Cyrtomium , Bogenfarn.			
„ daedaleum	75	—		T atratum Hort.	100	—	
„ furcatum schön	100	—		T falcatum Prest.	50	—	
„ monstrosum „	75	—		T Fortunei Prest.	100	—	
„ Pinderi sehr schön	100	—		Cystopteris Bernh.			
Goldieanum Hook.	100	—		fragilis Bernh.	50	—	
lobatum Sw.	75	—		bulbifera Bernh.	50	—	
spinulosum Sw.	50	—		Gymnogramma Desv.			
Thelypteris Sw.	50	—		Schriftfarn.			
Asplenium L. Strichfarn.				triangularis	—	—	
Adiantum nigrum L.	50	—		Neue Einführung vom Dreieck, das erste Goldfarn fürs Kalt haus, soll in England im Freien aushalten.			
Ruta muraria L. Mauer- raute, in Mauerrißen zu pflanzen, um altem Gemäuer mehr Reiz zu verleihen	25	200		Lastraea , siehe Aspidium.			
septentrionale Hoffm.	—	—		Lomaria Willd. Saumfarn.			
wie Ruta muraria zu ver- wenden.				alpina Spr.	50	—	
Trichomanes L. desgl.	30	—		Reizendes kleines Farn.			
Athyrium , Rth.				Spicant siehe Blechnum.			
Filix femina Bernh.	50	—		Onoclea L.			
„ „ corymbiferum	50	—		sensibilis L.	50	—	
„ „ cristatum	100	—		Struthiopteris Hoffm.	30—50	—	
„ „ Elworthy schön	75	—		(Struthiopteris germa- nica Willd.)			
„ „ multifidum „	60	—		Wegen des trichterförmigen Paares unstreitig eins der schönsten Farne.			
„ „ multiceps	60	—					
„ „ Tritzelliae	75	—					

	à St. à Dtz.			à St. à Dtz.	
	Pf.	Pf.		Pf.	Pf.
Osmunda Tourn.			Pteris L., Adlerfarn.		
regalis L.	100	—	aquilina L.	25	—
Das impoſanteſte einheimiſche			Topfexemplare . . .	50	—
Farn, von ausgezeichneter Wirkung			Scolopendrium Sm.		
in ſchattigen Partien des Parks			vulgare Symons . . .	30	—
frei auf Raſen truppweiſe gruppiert.			(Scol. officinarum Sw.)		
regalis var. cristata . 200	—	—	Hirſchjunge.		
Interreſſante Neuheit.			Bekanntes ſehr ornamentales		
Phegopteris Fee.			Farn. Varietäten die Stammform		
Dryopteris Fee . . .	50	—	an Schönheit weit übertreffend.		
(Polypod. Dryopt. L.)			vulgare acutale . . .	50	—
hexagonopterum Fée . 50	—	—	crispum ſchön! . . .	75	—
Robertianum A. Br. . 50	—	—	cristatum	75	—
(calcareum Fée).			daedalium ſchön! . 100	—	—
Physematum f. Woodsia.			digitatum extra! . 100	—	—
Polypodium L., Tüpfel-			undulatum ſchön		
farn.			und ſelten! . . 100	—	—
vulgare L., Engelſüß . 25	200	—	nudicaule	50	—
Zur Bekleidung von ſchattigen			Struthiopteris f. Onoclea.		
ſelbſt trockenen Abhängen ausge-			Woodsia.		
zeichnet.			obtusa Hook. . . .	—	50
vulgare L. var. auritum			Selaginella Spring.		
Willd.	50	—	Moosfarn.		
" " eristatum . . .	50	—	helvetica Spring. . .	—	50
" " cambric-			Reizende, vollſtändig winter-		
cum L.	50	—	harte Selaginelle von den ſchatti-		
Unbedingt die ſchönſte Varietät			gen Bergabhängen der Schweiz die		
aber etwas empfindlich.			in den Gärten ſo gut wie gar nicht		
Polystichum, D. C.			bekannt iſt, während ſie die allge-		
angulare Pr. var. gran-			meiſte Verbreitung verdient. In		
didens ſchön	75	—	jedem noch ſo kleinen Garten fin-		
decursive-pinnatum Kge. 100	—	—	det ſich ein Plätzchen für dieſes		
			zierliche Pflänzchen.		
12 Sorten Freiland-Farne nach unſerer Wahl 4 Mark.					
12 Sorten Freiland-Farne nach unſerer Wahl, feinere, 6 Mark.					

Freiland-Eriken.

Die Kultur der Freiland-Eriken macht nur geringe Mühe, da es genügt dieſelben auf ein mit Heideerde gemiſchtes Gartenbeet in ſonniger Lage zu pflanzen und den Boden im Winter etwas zu decken. Wir kul-

tiviren ein sehr empfehlenswerthes Sortiment, von welchen die mit einem * versehenen Arten für seine Bouquetbinderei unentbehrlich sind.

- * *Erica Tetralix* L. alba großglockig, die früheste, August.
- * " " *Mackayana* Bab.
- * " *vagans* L. (multiflora Huds.) sehr reichblumig, Septbr.
- * " " alba.
- * " *carnea* L. (herbacea L.)
- " *ciliata* L. sehr zierlich, mit großen dunkelrothen Blüthen im Spätsommer, verlangt leichte Decke.
- * *Calluna vulgaris* L. alba spätblühend.
- * " " *Alporti*, dunkelroth, sehr schön.
- " " *dumosa* } für Felspartien wegen des nieder-
- " " " *aurea* } liegenden Wuchses sehr geeignet.
- * " " *elata*, weiß, spätblühend.
- * " " *flore pleno*, reizend.
- " " *fol. arg. var.*, zur Bekleidung von Felspartien.
- * " " *Hamiltoniana*, groß, weißblühend.
- * " " *pumila*, weiß, frühblühend, in Knospen sehr effektiv.
- " " *prostrata*, für Felspartien wegen des niederliegenden Wuchses sehr geeignet.
- " " *pygmaea*, reizende Zwergform.
- * " " *Reginae*, weiß, mittelfrüh.
- " " *Searly*, weiß, späteste.
- " " *tomentosa*, sehr distinkt.

Bryanthus erectus, roth, großblumige sehr schöne Ericacee, blüht im Frühjahr.

Vaccinium macrocarpum Ait. (Cranberry).

10 Stück 50 Pfg. (je 2 Pfl. in einem Topf, stark durchwurzelt).

Die großfrüchtige Preiselbeere bildet in Amerika einen bedeutenden Handelsartikel und liefert dort pro Acker (c. $\frac{1}{2}$ Hektar) einen Betrag bis 500 Dollar, wird auch bei uns schon vielfach versuchsweise angepflanzt. Durchaus winterhart und gedeiht sowohl in Moor- als auch in feuchtem Sandboden.

1. Ananas-Erdbeeren.

Fragaria grandiflora.

100 Stück 1 Mark.

Anna Elisabeth (hortus Wernigerod.) Frucht groß, hellroth, hahnenkammartig, aromatisch, sehr volltragend.

Belle de Paris großfrüchtig, spät, 1. Rang.

Brown's Wunder (Child & Lorimer 1871). Frucht mittelgroß, beinahe rund, hellroth, Fleisch weinartig, süß, fein aromatisch, erstaunliche Fruchtbarkeit.

Cremont.

Delice d'Automne spät, vorzüglich.

- Dr. Nicaise.** Frucht sehr groß, oft enorm groß, monströse Form, hellorangeroth mit purpur, Fleisch weißlich rosa, weich, mäßig tragbar, Schauffrucht.
- Elton Pine (Knight).** Frucht groß, dunkelroth, kegelförmig oder viertantig, Fleischroth, schmelzend, sehr säuerlich, gewürzreich, reichtragend, für nördliche Lagen, zu Confitüren.
- Globe (de Jonghe)** großfrüchtig, ziemlich spät, 1. Rang.
- Goliath oder Riesenerdbeere (Kilgag)** Frucht sehr groß, zinnoberroth, abgestumpft kegelförmig. Fleisch weiß, saftig, gewürzreich, reichtragend, spät, für feuchten Boden.
- Gabriele (Dr. Nicaise).** Frucht ziemlich groß, dunkelroth, Fleisch roth, sehr fest, süß, sehr saftig, sehr reichtragend, sehr spät reifend.
- Keen's Seedling.** Frucht groß, früh, 1. Rang.
- Lucas (de Jonghe).** Frucht sehr groß, dunkelfarmoisin, rundlich, Fleisch rosa, schmelzend, sehr süß, ziemlich spät, reichtragend, werthvoll zum Treiben.
- Marguerite (Lebréton).** Frucht sehr groß, glänzend roth, länglich kegelförmig, gelappt und zugespitzt, Fleisch orangeroth, süß, gewürzreich, sehr tragbar, 1. Rang.
- Merveille.**
- Perfection (Dr. Nicaise).** Frucht groß, dunkel weinroth, kegelförmig oder gelappt, Fleisch dunkelroth, sehr saftreich und gewürzig, Wuchs kräftig, äußerst volltragend, früh.
- Reuz van Zuidwijk (C. van de Water).** Frucht sehr groß, abgeplattet oder kammförmig, lebhaft zinnoberroth, Fleisch röthlich, schmelzend, sehr angenehm aromatisch, sehr spät.
- Roseberry maxima (Nouvel).** Frucht groß, veränderlich rundlich oder breitgedrückt, Fleisch rethlich, saftig, aromatisch, vorzügliche Treibsorte.
- Sir Joseph Paxton (Bradly).** Frucht sehr groß, rund oder oval, glänzend farmoisin, Fleisch lachsroth, fest, sehr gewürzreich frühreifend, volltragend, 1. Rang.
- White Pine Apple.** Frucht groß, rund, reinweiß, rosa angehaucht, Fleisch reinweiß, schmelzend, sehr gewürzreich, volltragend, frühreifend.

1 Dutzend 50 Pfg.

- Alpha (Dr. Roden).** Frucht groß, lebhaft roth, Fleisch fest, blasroth, schmelzend von erhabenem Geschmack, Wuchs niedrig, die früheste von den großfrüchtigen, zum Treiben vorzüglich.
- Auguste Nicaise (Dr. Nicaise 1872).** Frucht sehr groß, herzförmig, scharlachroth, Fleisch dunkellachsroth, gewürzreich, ausgeprägter Aprikosengeschmack, mittelfrüh.
- Belle Bretonne (Boisselot).** Frucht sehr groß, abgestumpft kegelförmig oder gelappt, glänzend roth, Fleisch rosa, fest, schmelzend, sehr gewürzreich, reichtragend.
- Belle Cauchoise (Acher mittelfrüh).** Frucht groß, oval, kirschroth, Fleisch rosa, von vorzüglichem Wohlgeschmack, sehr reichtragend.
- Deutscher Held (Goeschke).** Frucht groß, schmelzend, von aromatischen, mild weinsäuerlichem Geschmack, glänzend dunkelroth, Fleisch blutroth, einzelne Stiele mit 10 - 12 ausgebildeten Früchten.
- Deutsche Perle (Goeschke 1879).** Frucht weiß mit rosa Anhauch, Gestalt glockenförmig, sehr aromatisch, reichtragend und frühreifend.
- Director Fürer (Goethe).** Frucht sehr groß, hahnenkammförmig, hellrosa, Fleisch weiß, angenehm säuerlich mit erhabenem Ananas-Geschmack, reichtragend, spätreifend.
- Duc d'Edinbourg (1878).** Amerikanische Züchtung, nebst Great American die größte Erdbeere, 7 Früchte wogen $\frac{1}{2}$ Kilo, festes aromatisches Fleisch, extra zur Massenkultur zu empfehlen.
- Eugen Fürst (Goeschke).** Frucht groß, dunkelschwarzbraun, Geschmack süß und saftig, Wuchs niedrig, kräftig, sehr fruchtbar, mittelfrüh.
- Helene Gloede (Gloede fils 1870).** Frucht sehr groß, vieredig, hahnenkammförmig, orangeroth, Fleisch reinweiß, fest, süß, erhabener Geschmack, reichtragend, sehr spätreifend.
- Helene Mulié vorzüglich.**
- Helvetia (Goeschke 1879).** Frucht lang, lebhaft zinnoberroth, Fleisch weiß, sehr aromatisch, reichtragend und mittelfrüh.
- James Veitch (Gloede).** Frucht sehr groß, herzförmig, lebhaft zinnoberroth, Fleisch rosa, gewürzhaft mit ausgeprägtem Aprikosengeschmack, reichtragend, frühreifend.
- La bonne Aimée** Frucht groß, roth, reichtragend, von vorzüglichem Geschmack, 1. Rang.

- Monseigneur Dupanloup. Frucht sehr groß, konisch, glänzend roth, Fleisch blaß rosa, sehr saftig und aromatisch, ziemlich spätreifend, lange haltbar.
- Monseigneur Fournier (Boisselot 1876). Frucht sehr groß, von veränderlicher gelappter Gestalt, dunkelweinroth, Fleisch dunkelroth, sehr saftig, weinig, sehr spät.
- Marschal Mac-Mahon (Mulié 1876). Frucht sehr groß, die ersten breit, die späteren herzförmig, glänzend zinnoberroth, Fleisch rosa, fest, süß, sehr reichtragend.
- Phénomène (Ch. Delahousse). Frucht sehr groß, hellkarmin, in 2 oder 3 Lappen gespalten, Fleisch weißrosa, süß, Pflanze robust, früh und reichtragend.
- Professor Burvenich (Ch. Delahousse). Frucht groß, rundlich, hahnenkammförmig, dunkelroth lackglänzend, Fleisch dunkelrosa, zuckerig, sehr fruchtbar, mittelfrüh.
- Professor Pynaert (Ch. Delahousse). Frucht außerordentlich groß, hahnenkammförmig gelappt, schön roth, Fleisch weißrosa, saftig, von mittlerer Reifezeit.
- Pronty's Seedling. Frucht sehr groß, reichtragend, empfehlenswerthe Neuheit.
- Rudolf Goethe (Goeschke). Frucht groß, abgerundet, hellzinnoberrosa, Spitze weißlich, Fleisch weiß, köstlich aromatisch, fruchtbar, mittelfrüh.
- Sieger von Würth (Goeschke). Frucht sehr groß, stumpf kegelförmig, glänzend zinnoberroth, Fleisch rosa, gewürzreich, früh, reichtragend.
- Theodore Mulié (Ch. Delahousse). Frucht sehr groß, karminroth, Fleisch dunkelrosa, sehr saftig und wohlgeschmeckend, frühreifend, Markfrucht.
- Triomphe d' Orléans.

1 Dutzend 1 Mark.

- Duncan, Frucht groß, dunkelroth I. Rang.
- Königin Marie Henriette (Pr. Pynaert). Frucht groß, soll als Treiberdbeere alle übertreffen.
- Professor Liebig (Goeschke). Frucht sehr groß, oval, glänzend roth, Fleisch rosa, gewürzreich, an Moschuerdbeeren erinnernd, sehr reichtragend, mittelfrüh, Fleisch fest, unempfindlich gegen Witterungseinflüsse.

2 Stück 50 Pf.

- Gräfin Schaffgotsch (Goeschke 1879). Frucht sehr groß, oval, glänzend zinnoberroth, Fleisch weiß, sehr gewürzreich, mittelfrüh, lange ausbauern, reichtragend.
- Great American (Durand 1879). Amerikanische Züchtung, Riesenerdbeere, einzelne Früchte wiegen 100 Gramm bei 8 Zoll (20 Centm.) Umfang, glänzend dunkelroth, spät.
- Juliette (Lapierre 1878). Frucht ansehnlich groß, sehr spät reifend, glänzend hellroth, Geschmack ausgezeichnet, ungemein fruchtbar. Der Züchter hat der Pariser Zentral-Gesellschaft eine Pflanze mit 240 gut ausgebildeten Früchten vorgelegt.
- König Albert von Sachsen (Goeschke 1879). Frucht enorm groß, von breiter abgerundeter Form, glänzend kirchroth, sehr fruchtbar, viele Ausläufer treiben noch Bütteln und liefern im August eine zweite Ernte, mittelfrüh.

2. Monats-Erdbbeeren.

Fragaria semperflorens.

1 Dutzend 50 Pf.

- Belle de Montrouge (Lapierre). Früchte verhältnismäßig sehr groß und sehr reichtragend, von Anfang Juni bis zu den Herbstfrösten Früchte liefernd, Fruchtstiele sehr verzweigt und aufrecht stehend, Kelchblätter blattartig erweitert, interessant, Früchte schön und von guter Qualität.
- Deutscher Schütz (Busse). Frucht dunkelroth, dunkelste Monatserdbeere, Fleisch roth, sehr gewürzreich von feinem Aroma.
- Gewöhnliche Monatserdbeeren pro Hundert 1 Mark: Rothfrüchtige mit sowie auch ohne Ranken, weißfrüchtige mit sowie auch ohne Ranken.

3. Scharlach-Erdbeeren.

Fragaria virginica.

100 Stück 1 Mark.

May Queen (Nicholson). Frucht mittelgroß, orange zinnoberroth, sehr süß und gewürzhaft, Pflanze kräftig, sehr tragbar, die früheste aller bis jetzt bekannten Erdbeeren, vorzügliche Treiberdbeere.

4. Chili-Erdbeeren.

Fragaria chilensis.

Verlangen zur Ausbildung der Früchte reichliches Beießen und einen leichten mit Haideerde vermischten Boden, im Winter leichte Schutzdecke von Tannenreisig.

Jeanne Hachette (Gloede). Frucht groß, abgestumpft, konisch, blasförmig, Fleisch schneeweiß, sehr gewürzreich, reichtragend, spätreifend.

Lucida perfecta (Gloede). Frucht groß, rund, orangeförmig, Fleisch weiß, süß, etwas weinsäuerlich, ausgezeichnet gewürzreich, mittelfrüh oder spät, Blätter glänzend.

ya 4665

Verlag von Wiegandt, Hempel & Parey in Berlin, SW., 91 Zimmerstr.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung und Postanstalt.

DEUTSCHER GARTEN

Monatsschrift für Gärtner und Gartenfreunde.

Unter Mitwirkung
zahlreicher Fachmänner aus Wissenschaft und Praxis
herausgegeben von

Dr. C. BOLLE,

Zweiter Vors. d. Vereins zur Beförd. d. Gartenbaues in d. Kgl. Pr. Staaten

Mit zahlreichen Holzschnitten und Farbendrucktafeln.

Probehefte liefert die Verlagshandlung gratis franco.

Mit zahlreichen Holzschnitten und Farbendrucktafeln.

Preis für den Jahrgang von 12 Heften mit Farbendrucktafeln 20 Mk.

Gärtnerische Werke,
welche wir
auf Wunsch für unsere werthen Geschäftsfreunde gern bereit sind zu
besorgen.

Verlag von Wiegand Hempel & Sarey, Berlin.

Deutsche Pomologie.

Chromolithographische
Abbildung, Beschreibung und Kulturanweisung der empfehlenswerthesten
Sorten Aepfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen, Pfirsiche und Weintrauben.

Nach den Ermittlungen des Deutschen Pomologen-Vereins
herausgegeben von

W. Lauche,

Königlicher Garten-Inspector zu Potsdam.

Die Ausgabe des Werkes geschieht in monatlichen Heften von 4 Farbendruckbildern
nebst dazu gehörigem Text und wird in 4 Jahren vollendet sein.

Preis der Lieferung 2 Mark.

Deutsche Dendrologie

von

W. Lauche.

Systematische Uebersicht, Beschreibung, Kulturanweisung und Verwendung
der in Deutschland ohne oder mit Decke aushaltenden Gehölze.

Mit 283 Holzschnitten. 20 Mk. Gebunden 22,50 Mk.

Handbuch des Gärtnerischen Planzeichnens.

Von **G. Eichler.**

Mit 18 Chromolithographien und 125 in den Text gedruckten Holzschnitten.
In Quartformat. Preis in Leinen gebunden 14 Mark.

Verlag von Carl Wiffersodt, Leipzig.

Die Praktische Messkunst und Mathematik für Gärtner, Landwirthe etc.

von W. Legeler.

Dritte verbesserte und umgearbeitete Auflage, mit 240 Holzschnitten.

Herausgegeben

von **G. Eichler.**

Preis in Leinen gebunden 6,80 Mark.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 international (C BY-ND 4.0)